

ATENCION: Lea el rótulo

Instrucciones: Espolyorear sobre el animal y masaiear suavemente a contrapelo para facilitar su penetración, Repetir una vez por semana, Evitar la exposición al agua en los días siguientes a la aplicación del producto

Fórmula: Cada 100 g contiene: Propoxur 1.00 g: Excip. c.s.p. 100 a%.

Cada 100 g contiene: Propoxur 1.00 g%; Excip. c.s.p.

Conservar entre 4 v 35° C. En Perú conservar entre 15 v 35°C. En Argentina: SENASA Cert. Nº 85.398. Estab. Flab. No 8.596. Fabricado por: BINKA S.A. Méiico 1060 B1868BDF, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Distribuido por Laboratorios König S.A. Av. B. Rivadavia 719, B1868AOA, Avellaneda, Bs. As. Tel. (011) 4208-4141 consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc., Dr. Oscar Hortas, M.V. M.N. 3136. En Uruquay: MGAP No 4.567. Imp. y dist. por König Uruguay S.A. San Fructuoso 1169, Montevideo, Tel (+598) 22083920, direcciontecnicauv@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. En Bolivia: SENASAG Nº 5679/13. Imp. y dist. por VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. Av. Pirai Nº 493, Santa Cruz. Tel: (03) 352-0261. Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. En El Salvador: Imp. v dist. por SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A. DE C.V. edificio Avante. suite 5-01. Blvd. Luis Poma, Santa Flena, Antiquo Cuscatlan, Tel. (503) 2505 5555/5565. En Guatemala: Imp. y dist. por SUMINISTROS PORCINOS, S.A. 3a. Av. 41-60, zona 12 col. Monte María I. Centro empresarial Monte María, bodega 104. Tel. (502) 2479 1568 / 2479 0066, Reg. MAGA No xxx. En Paraguay: SENACSA Reg. No 5.236. Imp. v dist. por CRESUR S.A. Av. José Félix Bogado 1487 c/Padre Casanello, Asunción. ATC CRESUR (021) 333-407, RUC: 80014725-1 Reg. Alicia Escobar Rip. N°:1882. En Perú: SENASA Reg. Nº F.87.10.1.0015 Importado y distribuido por GLOBALVET S.A.C. Calle Mario Valdivia Nº 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima. Central: (511) 719-0377. En Venezuela: Imp. v dist. por Representaciones Adalca: C.A. Rif: J-30295110-0. Reg. No P.I 8.154. Tel. 0241-871-6071/7340, Valencia, As. Téc. Dra. Carmen Cavet, M.V. CPF1207143816.

WWW.KONIGLAB.COM



Precauciones: Veneno. Evitar la ingestión. No beber, fumar v comer durante su uso. Lavarse las manos con agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al médico veterinario. No almacenar junto a productos alimenticios. En caso de ingestión provocar inmediatamente el vomito y llamar al medico. No aplicar tratamientos paralelos a base de drogas anticolinérgicas dentro de los siete (7) días anteriores ni posteriores al tratamiento.

Contraindicaciones: No aplicar en cachorros ni en gatitos menores de 2 meses de edad. No aplicar en hembras en lactación para evitar que el producto entre en contacto con la boca de las crías.

Sintomas de intoxicación: Mareos, dolores de cabeza, náuseas, espasmos intestinales, vómitos, diarreas, contracción pupilar, disnea, sudores. Advertencia para el médico: carbamato

Antidoto: sulfato de atropina 1% vía intramuscular.

Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. Paraguay: (tro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. Uruquay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de elaboración.

