

Tratamiento específico contra la queratoconjuntivitis.
Rápida desinfección y cicatrización de todo tipo de heridas y quemaduras

BTK 35

USO VETERINARIO

BTK 35

USO VETERINARIO

CURATIVO Y PREVENTIVO DE LA QUERATOCONJUNTIVITIS

Fórmula: Cada 100 g de concentrado contiene: oxitetraciclina clorhidrato, 5,00 g; sulfadiazina plata, 0,85 g; acetato de hidrocortisona micronizado, 0,29 g; excipientes c.s.p. 100 g. Propelente: butano. Relación concentrado:propelente 18:82 p/p.

Centros Toxicológicos: **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicac. Tel. 0800-333-0160.

Bolivia: Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. El Salvador: Hospital San Rafael tel. 2525-5800 ext 148 y 149.

Guatemala: CIAT Tel. (502) 22513560 - (502) 22320735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Panamá:** CIMET Tel: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Nac. de toxicología 220-418, 204-800 (int. 1011). **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040.

República Dominicana: CIDI. Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de elaboración.

Lote y elaboración / vencimiento: Ver fondo del envase.

Establecimiento fraccionador: Ver fondo del envase

En Argentina:

■ SENASA Cert. N° 84.070


■ Estab. Elab. N° 5.580

Elaborado y distribuido por **Laboratorios König S.A.** Av. B. Rivadavia 719. B1868A0A. Avellaneda. Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136. En Uruguay: MGAP N° A-5407. Imp. y dist. por **König Uruguay S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. 22083920. direcciontecnica@koniglab.com

Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. En **Bolivia:** SENASAG CR-PUV N° xxx. Imp. y dist. por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Pirai N° 493, Santa Cruz. Tel: (03) 352-0261 Dir. Tec: Ernesto Rojas V. En **Ecuador:** Agrocalidad Cert. N° xxx. Imp. y dist. por **Ecuquímica C.A.** Av. Italo Km 1.5 entre Cisnes y Alondras, Via al Tingo, Quito. Tel. 022861 690. Resp. Téc. Dr. Fausto Yánez. En **El Salvador:** Imp. y dist. por **SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A. DE C.V.** Edificio Avante, suite 5-01, Blvd. Luis Poma, Santa Elena, Antiguo Cuscatlan. Tel. (503) 2505 5555/5565. En **Guatemala:** Imp. y dist. por **SUMINISTROS PORCINOS, S.A. 3ª.** Av. 41-60, zona 12 col. Monte María I, Centro empresarial Monte María, bodega 104, Guatemala. Tel. (502) 2479 1568 / 0066. Reg. MAGA N° xxx. En **Honduras:** Comerc. y dist. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** Residencial Monte Bello, Bl.43 casa #34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (00504) 2565-6847. Med. Reg. Dr. Abelardo Mejía Pineda. Reg. N° PF-4918. En **Panamá:** M.L.D.A. Reg. N° RF-4396-08 Imp. y dist. por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel.: 507-2205821. Resp. téc.: Dra. Enilda Pinto ID. 728. distrivet@cabloneta.net. En **Paraguay:** Imp. por **CRÉSUR S.A.** Av. J.F. Bogado 1482 ATC (021) 333-407. Reg. SENACSA N° 13.593. Regente Dra. Alicia Escobar Reg. Prof.: N° 1882. En **Perú:** SENASA Reg. N° xxx. Importado y distribuido por **GLOBALVET S.A.C.** Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima. (511) 719-0377. En **Venezuela:** Imp. y distribuido por **Representaciones Adalca; C.A.** Rif: J-30295110-0. Reg. M.I. 11.414. Tel.: 0241-871-6071/7340, Valencia. Asesora Técnica: Dra. Carmen Cavet, M.V. CPE 1207143782. Conservar entre 4 y 35°C. En **Perú:** conservar a menos de 30°C.

Polvo en Aerosol

Tópico oftálmico
Antibacteriano • Cicatrizante
Quemaduras



BTK 35 es una suspensión estable de oxitetraciclina clorhidrato, sulfadiazina plata y acetato de hidrocortisona en Cromadol[®], lo que confiere al producto penetración, adherencia y estabilidad, logrando un efecto antibacteriano, fungicida y antiinflamatorio. **BTK 35** es eficaz en el tratamiento curativo y preventivo de la queratoconjuntivitis bovina producida por *Moraxella bovis* y en las infecciones de heridas traumáticas y quirúrgicas.

Especies indicadas: Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, caninos, felinos, aves y reptiles.

Instrucciones de uso: Agitar varias veces el envase antes de usar. Aplicación tópica. Higienizar la zona a tratar. Aplicar una capa delgada a una distancia de 15-20 cm, rociar en forma uniforme. Repetir el tratamiento cada 12 horas. La duración del tratamiento dependerá del tipo de afección y de la complicación de la herida; se recomienda continuar el tratamiento hasta lograr la curación. En el caso de la queratoconjuntivitis bovina y conjuntivitis en general aplicar cada 12 horas durante 3 a 5 días. En afecciones unilaterales aplicar preventivamente en el ojo sano.

Tiempos de espera: No posee.

Contraindicaciones: No aplicar en animales alérgicos a la oxitetraciclina.

Advertencias: Higienizar el área afectada previo al tratamiento. Efectuar la aplicación a favor del viento para no afectar al operador. En caso de aplicación accidental a un animal alérgico, discontinuar el tratamiento. Evitar el contacto del producto con piel y mucosas humanas.

Precauciones: no fumar, comer o beber durante su uso. Lavarse las manos después de su aplicación. Inflamable, No pulverizar sobre llama. No exponer a temperatura mayor a 50°C. No arrojar al incinerador o al fuego. No perforar. Prohibido su relleno.

Consulte al médico veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

VENTA LIBRE: (venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario)



Peso Neto: 250g
Contenido: 440ml
Industria Argentina

LK König



MATERIAS PRIMAS
IMPORTADAS

LK König