

LITOGRAFÍA KOBRA
MEDIDAS ÁREA DE IMPRESIÓN:
172 mm de ancho x 189 mm de alto.

Referencia:
Pantone Solid Coated
185 C

CURABICHERA EN SPRAY TÓPI

**Preventivo y curativo
de las miasis.**

**Válvula multifuncional
para facilitar la aplicación.**

Kobra®

Fórmula: Cada 100g de aerosol contiene: Cipermetrina (3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de α -ciano-3-fenoxibenzoilo 0,50 g%; DDVP (fosfato de O,O-dimetil-O-(2,2-diclorovinilo) 0,49 g%. Cada 100g de concentrado contiene: Cipermetrina (3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de α -ciano-3-fenoxibenzoilo), 1,30 g; DDVP (fosfato de O,O-dimetil-O-(2,2-diclorovinilo), 1,26 g y excipientes c.s.p. 100 g. Concentrado: Propelente: propano - butano. Relación concentrado / propelente: 38,46 / 61,54 p/p.

Indicaciones: Kobra® combate las miasis causadas por las larvas de dípteros, tales como Dermatobia hominis. Tratamiento y prevención de bicheras en intervenciones quirúrgicas como castración, descole, descorne, ombligo de los terneros, rajaduras de casco, heridas de cualquier origen. Heridas en general.

Especies: Bovinos, Ovinos, Equinos, Caprinos, Porcinos y Caninos.
Modo de aplicación: Uso externo. Agitar varias veces el envase antes de aplicar. Rociar en forma abundante la herida o bichera, desde una distancia de 10-15 cm, de manera de facilitar la penetración dentro de las heridas y bordes. En caninos rociar formando un halo en todo el borde de la herida, sin que el producto tenga contacto con el interior de la misma. Repetir la aplicación según criterio del profesional actuante. El número de aplicaciones como preventivo depende del tipo de herida y de las condiciones ambientales pero se recomienda en el caso de bicheras de ombligo, una sola aplicación dentro de las 24 horas del nacimiento. En el caso de heridas de castración se recomiendan 2 aplicaciones separadas por 72 horas.


Contraindicaciones: No aplicar en aves ni en felinos.

Precauciones: Producto tóxico. No fumar, comer ni beber durante su aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Lavarse las manos luego de su uso. No arrojar el envase al fuego. No perforar ni rellenar el envase. Los envases deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar profundamente con agua durante 15 min. y consultar al médico.

Síntomas de intoxicación: Exitación, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración y miosis. Llamar inmediatamente al médico o al centro toxicológico.

Antídoto: Del compuesto organofosforado (DDVP): 1-2 mL de sulfato de atropina al 1% vía intramuscular. Cipermetrina: aplicar tratamiento sintomático.

AE9020-V9



7 791432 010301



NO DAÑA
LA CAPA
DE OZONO

Centros Toxicológicos: **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Costa Rica:** Centro Nac. de Intoxicaciones Tel. 2223-1028. **Ecuador:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX): 1800-VENENO (836366) a Nivel Nacional. **El Salvador:** Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT tel. (502) 22513560 (502) 2232-0735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **México:** Serv. de Inf. Toxicológica SINTOX 01800-009-2800. **Nicaragua:** Centro Nac. de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289-7150/ 289-3328. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** CIDI. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Rep. Bolivariana de Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Nota: El Laboratorio no se responsabiliza por las consecuencias que pudiera causar el uso inadecuado del producto.

Tiempo de espera: Pre-faena: 6 días. Para la leche con destino al consumo humano: 6 horas.

En Argentina Resolución SENASA Nº 1343/93.

En Perú: 48 horas pre-faena y pre-orden

Conservar entre 15 y 35°C. No refrigerar. No congelar.

Lote, Elaboración y Vencimiento: Ver fondo del envase.

Establecimiento Fraccionador: Ver fondo del envase.

En Argentina:

Elaborado en BINKA S.A. México 1060, B18688DF, Avellaneda, Buenos Aires.

Distribuido por LABORATORIOS KÖNIG S.A. Uruguay 720, B18688AB, Avellaneda, Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141 consultatecnica@koniglab.com

Dir. Tec. Dr. Oscar Hortas, M.V. M.P. Nº 2216. **En Uruguay:** Reg. M.G.A.P.: A-3940. Imp. y dist. KÖNIG URUGUAY S.A. García Lagos y Camino al paso Hondo, Colonia Nicolich, Canelones, 598 2696 3343. Dir. Tec. Dr. Raúl Laites. E-mail: direcciontecnicay@koniglab.com. **En Bolivia:** SENASAG CR-PUV Nº F 004768/11. Imp. y dist. VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. Parque Industrial Avenida Transversal 7 Mza. Pl 28 Lote 1 Esq. Diagonal 3, Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261 Dir. Tec: Ernesto Rojas V. **En Costa Rica:** MV-xxx. Imp. y dist. FARY-VET S.A. 200 Norte 75 Oeste de Cereza, Barroil, Heredia. Tel. 4010-0212. **En Ecuador:** Nº xxx-AGROCALIDAD. Imp. y dist. ECUAQUIMICA, Av. José Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo, Km 1.8. Tel.: 02 5505040; Guayaquil - Ecuador. **En El Salvador:** Imp. y dist. RHEMA Residencial Tazumal avenida los Bambúes Polígono # 3 Casa # 4 San Salvador, El Salvador. Repente Responsable: María Belén Quintanilla de Fernández, Médico Veterinario, Identificación Profesional Nº 295. **En Guatemala:** Reg. MAGA: xxx. Imp. y dist. INMOVET S.A. 2da Calle 17-40 Sector B1, San Cristóbal, Zona 8 de Mixco, Guatemala. Responsable Técnico: César Humberto Cardona Orellana. **En Honduras:** Imp. y dist. AGRIVETSA S.A. Reg No. xxx. Residencial Palma Real, El Estero, Bloque C No. 45, Tegucigalpa. Tel. (504)22343170 Med Reg- Dra. Nadienka Casco. **En México:** Reg. S.A.G.A.R.P.A. Nº 0-xxxx-xxx. Imp. y dist. AZDOLVET S.A. de C.V. Blvd. Condat de Sayavedra 250, Cdo. de Sayavedra, Atlapatz, México, CP 52938. Tel. 53 08 7337. Dir. Tec: M.V. Marco Alejo. **En Nicaragua:** MV xxx. Imp. y dist. INVERSIONES ANTARES S.A. Carretera Norte Km 8 1/2 de los semáforos de la Suabasta 200 mts al oeste, Managua, Nicaragua. Dir. Tec.: Dr. Jorge A. Sobalvarro Barquero. **En Panamá:** M.I.D.A. Reg. Nº xxx. Imp. y dist. DISTRIVET S.A. Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205621, distrib@calabandona.net. Responsable técnico: Dra. Enilda Pinto ID. 728. **En Paraguay:** Reg. SENACSA Nº XXX. Imp. por CRESUR S.A. Gral. Delgado Nº 747 esq. Patricio Escobar RUC: 80014725-1 Tel: 021 901000. Asesor Técnico. Dra. Alicia Escobar Nº Reg. Prof. 1882. **En Perú:** Imp. y dist. GLOBALVET S.A.C. Reg. SENASA Nº F-87.301.0017 Calle Mario Valdivia Nº 180 Urb. Maranga Sta Elapa, San Miguel, Lima, Perú. Tel. (511) 719-0377. **En República Dominicana:** Cert. Nº 8591. Imp. y dist. FLEXEMPAQUES S.R.L. Calle 16 de Agosto Nº1, Los pepines, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel.: (809) 241-3095/ 233-3222. **En la República Bolivariana de Venezuela:** Reg. Nº (NSAI) xxx. Imp. por GLOVETZ C.A. Rif: J-40000322-9. Estado de Lara, ZP9001. Tel. (58)25-1415-5148, E-mail: glovetzr@gmail.com. Asesor Técnico: M.V. José Ramos, CPE.

Cipermetrina • DDVP

ANTIMIÁSICO



REPELENTE



URICIDA



ALTA ADHERENCIA



Fórmula antigoteo que evita desperdicios.

AGITESE BIEN ANTES DE USAR

ATENCIÓN: LEA EL RÓTULO

Peso neto: 260 g | Contenido: 419 mL
USO VETERINARIO - Venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario.
INDUSTRIA ARGENTINA

König