Pantone® Solid Coated Neutral Black | Pantone® Solid Coated 2945 C | Pantone® Solid Coated 185 C | BLANCO | HOJALATA

AGITAR BIEN ANTES DE USAR

Indicaciones: Tratamiento preventivo y curativo de bicheras en todo tipo de heridas en las especies bovina, equina, ovina, caprina, porcina y canina; con propiedades larvicidas, antimicrobianas, hemostáticas y cicatrizantes. Puede utilizarse en animales de cualquier edad inclusive recién nacidos. Forma una película protectora que elimina el sangrado. Previene la miasis en los trabajos de rutina (cirugía, ombligo, descole, descorne) gracias a su poder repelente. **Bactrovet Plata AM** es eficaz frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la sulfadiazina argéntica y larvas de moscas productoras de miasis: *Lucilia sp.*; *Calliphora sp.*; *Callitroga sp.* y *Sarcophaga sp.*

Aplicación: Agitar varias veces el envase antes de aplicar. Colocar el envase a 10 cm del área a tratar y rociar uniformemente, asegurando la penetración del producto dentro de la herida. Aplicar también alrededor de la misma, formando un halo de 5 cm. En caso de bicheras profundas es necesario asegurarse la penetración del producto en las cavidades. El color plateado de la herida permite determinar qué animal ha sido tratado. En caso de miasis la aplicación se puede repetir diariamente hasta la curación. La duración del tratamiento depende del tipo de afección y de la complicación de la herida, se recomienda continuar la aplicación hasta lograr la cicatrización. El número de aplicaciones a realizar como preventivo dependen del tipo de herida y de las condiciones ambientales. En la prevención de las bicheras del ombligo basta con una sola aplicación dentro de las 24 horas del nacimiento. En caso de herida de castración en grandes animales se recomiendan dos aplicaciones separadas por 72 horas.

Fórmula: Cada 100 g de concentrado contiene: sulfadiazina de plata 0,1 g; aluminio 5,0 g; DDVP (fosfato de 0,0 dimetil y de 0 (2,2- diclorovinil)) 1,6 g; cipermetrina (2,2, dimetil-3-(2,2 -dicloroviniI)-ciclopropil carboxilato de alfa ciano-3-fenoxibencilo) 0,4 g; excipientes c.s.p. 100g.
Propelente: Butano. Relación concentrado/propelente: 22/78 p/p.

Precauciones: Producto tóxico. No fumar, comer ni beber durante su uso. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al médico veterinario. Lavarse las manos después de su aplicación. Efectuar la aplicación en favor del viento para que no afecte al operador. Agitar varias veces el envase antes de aplicar. No arrojar el envase al fuego. No perforar. No rellenar el envase. Si el producto contacta con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos deben lavarse profusamente con agua durante por lo menos 15 minutos y luego consultar al médico.

Síntomas de intoxicación: Excitación, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, miosis.
Para el compuesto organofosforado DDVP el antídoto es el sulfato de atropina al 1% vía intramuscular. Repetir hasta remisión de los síntomas. La cipermetrina carece de antídoto específico conocido. Si los síntomas difieren de los mencionados se deberá instaurar tratamiento sintomático.

EXCLUSIVA VALVULA MULTIDIRECCIONAL QUE FACILITA EL MANEJO DEL ANIMAL

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

POLVO EN AEROSOL

Bactrovet® plata AM

Sulfadiazina de plata • Aluminio • Cipermetrina • DDVP

CURABICHERA

- ANTIMIÁSICO
- REPELENTE
- CICATRIZANTE
- HEMOSTÁTICO
- ALTA ADHERENCIA
- BACTERICIDA
- ANTIMICÓTICO

EFECTO LÁMINA PROTECTORA

En Ecuador:
antiparasitario externo, piretroide, antimicrobiano, quimioterápico.

USO VETERINARIO - Venta Libre (venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario). En Ecuador: Venta Libre.

Peso Neto: **146 g**
Cont.: **228 mL**
INDUSTRIA ARGENTINA

König

Centros Toxicológicos: Argentina: CNI Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Costa Rica:** CNI Tel. 2223-1028. **Ecuador:** Ctro. de Inf. y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) 1800-VENENO (836366). **El Salvador:** Hospital San Rafael tel. 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT tel. (502) 22513560/2232-0735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **México:** SINTOX 01800-009-2800. **Nicaragua:** Ctro. Nac. de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289- 7150/3328. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Rep. Dominicana:** CIDI. Tel.: (1809) 562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02)1722. **Rep. Bolivariana de Venezuela:** UCV Tel. (212) 605- 2586.

En Argentina:
SENASA Cert. N° 86.463
Estab. Elab.N° 8.596

Fabricado por **Binka S.A.** Méjico 1060, B1868BDF, Avellaneda, Buenos Aires para **Laboratorios König S.A.** Uruguay 720, B1868BAB, Avellaneda, Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141, consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, M.V. M.P. N°: 2216. **En Uruguay:** MGAP Cert. N° 4.746. Imp. y dist. **KÖNIG URUGUAY S.A.** García Lagos y Camino al paso hondo, Col. Nicolich, Canelones, 598 2698 3343, directiontecnicauy@koniglab.com. Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. **En Bolivia:** SENASAG Reg. CR PUV-F 000850/05. Imp. y dist. **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Parque Industrial Av. Transversal 7 Mza. PI 28 Lote 1 Esq. Diag. 3, Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261 Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. **En Costa Rica:** MV-6766. Imp. y dist. por **FARYVET S.A.** 200 Norte 75 Oeste de Cenada. Barreal, Heredia Tel. 4010-0212. **En Ecuador:** N° 3B3-281-9654-AGROCALIDAD. Imp. y dist. **ECUAQUIMICA** Av. José Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo. Km 1.8. Tel.: 02 5505040; Guayaquil - Ecuador. **En El Salvador:** Imp. y dist. **RHEMA** Residencial Tazumal av. los Bambúes Polígono # 3 Casa # 4 San Salvador. Regente Resp.: M. Belén Quintanilla de Fernandez, M.V., Id. Profesional N° 295. **En Guatemala:** Imp. y dist. **SUMINISTROS PORCINOS, S.A.** 3ª a. Av. 41-60, zona 12 Col. Monte María I Centro empresarial Monte María, Bodega 104. Tel. (502) 2479 1568/0066. **En Honduras:** Cert. N° PF-4921. Imp. y dist. **AGRIVETSA S.A.** Residencial Palma Real. I Etapa. Bloque C No. 45. Tegucigalpa. Tel (504) 22343170 Med. Reg. Dra. Nadienka Casco. **En México:** Reg. S.A.G.A.R.P.A. N° O-9595-XXXX. Imp. y dist. **AZOOLVET, S.A. de C.V.** Blvd. Condado de Sayavedra 250, Cdo. de Sayavedra. Atizapan, CP 52938, Tel: 53 08 7337. Dir. Téc. MV Marco Alemán. **En Nicaragua:** MV-11.722. Imp. y dist. **INVERSIONES ANTARES S.A.** Carretera Norte Km 8 ½ de los semáforos de la Subasta 200 mts al oeste. Managua. Dir. Téc.: Dr. Jorge A. Sobalvarro Barquero. **En Panamá:** M.J.D.A. Reg. N° RF-8801-20. Imp. y dist. **DISTRIVET S.A.,** Juan Diaz calle 1b, Tel.: 507-2205821. distrivet@cableonda.net Resp. Téc. Dra. Enilda Pinto ID. 728. **En Paraguay:** Reg. SENACSA N°: 5.222. Imp. y dist. **CRESUR S.A.** Gral. Delgado N° 747 esq. Patricio Escobar RUC: 80014725-1 Tel: 021 901000. Asesor Téc. Dra. Alicia Escobar N° Reg. Prof. 1882. **En Perú:** Reg. N°: F.27.30J.0015. Imp. y dist. **GLOBALVET S.A.C.** Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima. Tel. (511) 719-0377. **En República Dominicana:** Ministerio de Agricultura. Cert. N° 8451/2015. Imp. y dist. **FLEXEMPAQUES S.R.L.** Calle 16 de Agosto N°1, Los pepines, Santiago de los Caballeros, Santiago. Tel.: (809) 241-3095 / 233-3222. **En República Bolivariana de Venezuela:** N° de Reg. INSAI 2041PI33I0716589. Imp. por **GLOVETZ C.A.** Rif: J-40000322-9. Estado de Lara, ZP3001. Tel. (58) 25-1415-5148. glovetzjr@gmail.com. Asesor Téc: M.V. José Ramos. CPE 1007140278. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

Conservar por debajo de los 30° C. No refrigerar. No congelar. En Perú: Conservar entre 15 y 30° C. Los envases vacíos deberán ser descartados según la legislación local vigente. En Uruguay: Eliminar los envases vacíos en el centro de acopio más cercano.

Lote y elab. / vencimiento: Ver fondo del envase.
Establecimiento fraccionador: Ver fondo del envase.

AE9023-V10

7 791432 020232