Fórmula: cada 100 mL contiene: doramectina 1g % y excipientes c.s.p.

Indicaciones:

Parásitos internos

Parásitos gastrointestinales: *Ostertagia ostertagi* (adultos, L3 y L4, incluyendo inhibidas; *Ostertagia trifurcata; Haemonchus placei* (adultos, L3 y L4); *Trichostrongylus axei* (adultos y L4), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos y L4); *Cooperia oncophora* (adultos y L4), *Cooperia pectinata* (adultos y L4), *Cooperia curticei y Mc masteri* (L3); *Oesophagostomum radiatum* (adultos, L3 y L4); *Nematodirus helvetianus* (adultos), *Nematodirus spathiger* (adultos).

Parásitos externos: ácaros de la sarna (*Psoroptes communis* variedad *bovis*; garrapata común del bovino (*Boophilus microplus*).

Especies: Bovinos.

Administración y dosis:

Aplicar utilizando material estéril y desinfectar el sitio de inyección. Limpiar el tapón con alcohol para prevenir la contaminación del contenido del frasco. Inyectar en forma subcutánea en un pliegue por delante o detrás de la paleta.

Dosis: 1 mL cada 50 kg de peso. Equivalente a 200 µg de doramectina por kg de peso vivo.

Repetición de dosis, según criterio del profesional actuante.

Tiempo de espera: En bovinos de carne: 43 días.

Aprobado por SENASA como Garrapaticida Bovino para ser utilizado en zonas de control e indemne: focos de reinfestación con la indicación del Programa Nacional de Lucha contra la Garrapata (Resolución N° 382/2017), utilizando el poder residual obtenido en la Prueba Oficial. Prueba biológica realizada en el campo experimental Camba Punta. Porcentaje de eficacia: 99,01%. Poder residual absoluto: 11 días.

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

bactrovet®

INYECTABLE IN



Contenido neto: **200mL**

DORAMECTINA 1%
Endectocida

Contraindicaciones:
El producto no afecta la preñez. Sin embargo, no debe ser usado en hembras durante el último mes de gestación ni en vacas en lactancia. No se recomienda su uso en vacas lecheras cuyo producto tenga como destino el consumo humano.

Precauciones y advertencias:
Debe aplicarse por vía intramuscular o subcutánea únicamente. La producción de semen no se modifica después de una dosis doble en toros reproductores. No fumar ni comer durante la manipulación. Evitar el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. No contaminar fuentes de agua. Los envases deber ser eliminados según normas locales vigentes.

Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. Honduras: Llamar o acudir al médico. Panamá: CIMET Tel: (507) 269-2741. Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel.(021) 204-800/532. República Dominicana: CIDI. Tel: (1809)562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

No conservar por encima de los 30ºC.
Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de elaboración.
En Argentina: Importado y distribuido por

SENASA N°17-010
Est. Imp. N°: 6978

N° de Serie:

Fecha Elab.:

Laboratorios König S.A.
Uruguay 720 (B1868BAB) Buenos Aires. Argentina.
Tel. (011) 4208-4141 / consultatecnica@koniglab.com
Director Técnico: Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario MN 3136
En Uruguay: Reg. MGAP N°: A 5384 König Uruguay S.A.
San Fructuoso 1169, Montevideo, Uruguay Tel.598-22030055 - direccióntecnicauy@koniglab.com
Director Técnico: Dr. Raúl Leites.
Establ. elab. N° 18, Montevideo – Uruguay
Director Técnico: Dr. Washington Díaz, Matrícula 15009.