

USO VETERINARIO
Venta con receta veterinaria

basken®

SUSPENSIÓN

Antihelmítico para caninos y felinos

BASKEN® SUSPENSIÓN es una moderna asociación antihelmítica de pamoato de pirantel y pamoato de oxantel, que resume en un sólo producto las siguientes cualidades:

- Cubre el espectro completo de vermes redondos de caninos y felinos.
- Se administra en una sola toma.
- Aplicable en cachorros y gatitos desde los 15 días de edad.
- No requiere ayuno previo y puede administrarse con el alimento.
- No produce malformaciones congénitas ni afecta la fertilidad.
- Indicado en hembras gestantes y machos reproductores.
- Compatible con medicaciones paralelas, inmunizaciones, uso de collares antipulgas y otros antiparasitarios externos.
- Amplio margen de seguridad.
- Compatible con tratamiento simultáneo con tenicidas.
- Fácil de administrar por su buena palatabilidad.

Todas estas propiedades hacen de BASKEN® SUSPENSIÓN el antiparasitario de elección para cachorritos de corta edad y animales destinados a la reproducción, particularmente por su demostrada inocuidad y ausencia de efectos colaterales (náuseas o vómitos) a las dosis indicadas. Finalmente, y como rasgo distintivo de este vermífugo, cabe destacar que BASKEN® SUSPENSIÓN mata las larvas a medida que eclosionan los huevos, impidiendo el daño que usualmente provocan en los pulmones e hígado durante su migración.

Indicaciones: Parasitosis por *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* y *Trichuris vulpis*, de caninos y felinos, a partir de los 15 días de edad. Puede administrarse en hembras en cualquier estadio de gestación y en lactancia con cachorros de más de 15 días.

Administración y dosis: La dosis en perros y gatos es de 10 mg de pirantel + oxantel base por kilo. Aplicar la siguiente escala de dosificación: Hasta 1 kg de peso: 1 mL de suspensión. Más de 1 kg de peso: 1 mL por cada kg o fracción de kg. (Pamoato de pirantel, 14,5 mg/kg; pamoato de oxantel, 14,0 mg/kg).

Administrar por vía oral. Se puede administrar directamente al animal con la ayuda de la jeringa dosificadora adjunta, o incluido en una pequeña parte del alimento (para asegurar la ingestión completa de la dosis). El agradable sabor de BASKEN® SUSPENSIÓN facilita su administración.

NO REQUIERE AYUNO PREVIO NI POSTERIOR.

Normalmente una sola toma es suficiente para obtener la desparasitación deseada.

En trichuriasis severas, repetir el tratamiento por 3 días consecutivos, o triplicar, en una sola toma, la dosis indicada.

Se recomienda repetir la administración cada 15 días hasta los 3 meses de edad para eliminar los parásitos adultos provenientes de migraciones larvales previas a la administración de BASKEN® SUSPENSIÓN. A la vez se sugiere la realización del análisis coproparasitológico previo y posterior al tratamiento con cualquier antiparasitario. Consulte con su veterinario de confianza.

Propiedades Farmacocinéticas: Tanto el pamoato de pirantel como el pamoato de oxantel son sales de muy baja solubilidad que se absorben en muy pequeña proporción a nivel del tracto gastrointestinal. El 50 % de la droga administrada se detecta inalterada en materia fecal. Sólo un 7 a 8% de la droga aparece en orina, lo que indica una muy baja absorción. La pequeña proporción de droga absorbida es metabolizada en hígado y eliminada a través de sales biliares.

Propiedades Farmacodinámicas: El pamoato de pirantel y el pamoato de oxantel actúan directamente al nivel de la luz intestinal sobre las formas adultas de parásitos y sobre aquellas larvas que no han comenzado aún la migración. Ambas drogas son bloqueantes neuromusculares despolarizantes, induciendo marcada y persistente activación nicotínica que lleva a la parálisis espástica del parásito. El pirantel también inhibe la colinesterasa, causando contractura de lento desarrollo sobre los ascaris a una concentración 100 veces menor que la acetilcolina, matando las larvas a medida que eclosionan de los huevos en el tracto gastrointestinal, por lo que las larvas no ingresan al organismo animal y por consiguiente el hígado y los pulmones no son dañados por la migración larval. El pamoato de oxantel es altamente efectivo contra ancylostomas y trichuris y posee poca actividad contra áscaris. Contrariamente al oxantel, el pirantel es muy efectivo contra áscaris y no contra trichuris, y posee la misma actividad contra ancylostomas. La combinación de ambas drogas ha sido extensamente probada en humanos para el tratamiento de la helmintiasis múltiple siendo recomendada como la combinación de mayor eficacia y mejor tolerancia. Las dosis bibliográficas recomendadas para humanos son de 10 mg/kg de peso de cada uno de los principios activos.

Contraindicaciones: No posee.

Fórmula: Cada 100 mL contiene: Pamoato de pirantel 1,45 g; Pamoato de oxantel 1,40 g; Saborizante y excipientes c.s.p. 100 mL. Cada mL contiene: Pirantel base (como pamoato) 5 mg; Oxantel base (como pamoato) 5 mg; Saborizante y excipientes c.s.p. 1 mL.

AGITAR BIEN ANTES DE ADMINISTRAR.

En Argentina: Mantener a temperaturas inferiores a los 30° C. No congelar. No refrigerar. **En Costa Rica:** Conservar entre 15 y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al Médico Veterinario. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Centros Toxicológicos: **Argentina:** CNI Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Colombia:** 018000-916012. **Costa Rica:** CNI Tel. 2223-1028. **Ecuador:** Centro de Inf. y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX): 1800-VENENO (836366) a Nivel Nacional. **El Salvador:** Hospital San Rafael Tel. 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT tel. (502) 22513560-22320735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **México:** SINTOX 01800-009-2800. **Nicaragua:** Centro Nac. de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289-7150/3328. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Rep. Dominicana:** CIDI. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Elaborado y distribuido por LABORATORIOS KÖNIG S.A.

Uruguay 720. B1868BAB. Avellaneda. Buenos Aires.

Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com

Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, M.V. M.P. 2.216.

Importado y distribuido: Ver estuche.

www.koniglab.com

En Argentina:

SENASA Cert. N° 87-508

Estab. Elab. N° 5.580

PA9060-V27

 **König**