

Medida: 90 x 160 mm

Uso veterinario
Venta con receta veterinaria
En Ecuador: Venta Libre
En Colombia: Venta bajo fórmula
de Médico Veterinario

basken[®] PLUS

Antihelmíntico de espectro total para caninos y felinos
Comprimidos

BASKEN[®] PLUS es el antiparasitario que cubre el espectro total de vermes que afectan a caninos y felinos (nematodos y cestodos), basado en la combinación de tres drogas específicas y de máximo poder vermífida para sus respectivos espectros: pamoato de pirantel, pamoato de oxantel y praziquantel. Esta asociación posee como característica distintiva una gran eficacia parasitocida, inocuidad y la simplificación del tratamiento en una sola toma.

BASKEN[®] PLUS no sólo es efectivo contra los parásitos adultos, sino también contra las formas inmaduras de las tenias y larvas de nematodos. Esta última acción evita el daño que produce la migración de larvas en hígado y pulmón.

Indicaciones: Parasitosis por *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Dypilidium caninum*, *Taenia pisciformis*, *E. granulosus*, *Taenia taeniformis*, *Taenia hidatigena* y todo tipo de cestodos en general, de caninos y felinos. Apto para cachorros y gatitos desde las 3 semanas de edad. Apto para machos reproductores, hembras en cualquier estadio de gestación y hembras lactantes con crías de más de 21 días.

Administración y dosis: Caninos y felinos: BASKEN[®] PLUS: 1 comprimido cada 2,5 kg de peso. En animales adultos una sola dosis es suficiente para lograr la desparasitación deseada. En cachorros y animales inmunosuprimidos repetir a los 15 días de la primera toma. No requiere ayuno previo ni posterior. Se puede mezclar con el alimento, controlando la completa ingestión del mismo. El margen de seguridad es de hasta 60 veces la dosis recomendada. No produce efectos colaterales indeseables. Compatible con tratamientos paralelos, vacunaciones, aplicación de ectoparasitocidas o collares antipulgas. En casos de trichuriasis severa, es conveniente repetir el tratamiento por 3 días consecutivos.

Propiedades Farmacocinéticas: Tanto el pamoato de pirantel como el pamoato de oxantel son sales de muy baja solubilidad que se absorben en muy pequeña proporción a nivel del tracto gastrointestinal. El 50 % de la droga administrada se detecta inalterada en materia fecal. Sólo un 7 a 8 % de la droga aparece en orina, lo que indica una muy baja absorción. La pequeña proporción de droga absorbida es metabolizada en hígado y eliminada a través de sales biliares.

El 80 a 100 % del praziquantel administrado oralmente se absorbe a nivel del intestino y se elimina prácticamente inalterado por orina y bilis. La absorción es rápida, alcanzándose niveles máximos de concentración en plasma dentro de la primera hora post-administración. La eliminación del praziquantel se completa dentro de las 24 horas y a los 5 días post-administración no es posible detectar residuos en plasma o excretas.

Propiedades Farmacodinámicas: El pamoato de pirantel y el pamoato de oxantel actúan directamente al nivel de la luz intestinal sobre las formas adultas de parásitos y sobre aquellas larvas que no han comenzado aún la migración. Ambas drogas son bloqueantes neuromusculares despolarizantes, induciendo marcada y persistente activación nicotínica que lleva a la parálisis espástica del parásito. El pirantel también inhibe la colinesterasa, causando contractura de lento desarrollo sobre los ascaris a una concentración 100 veces menor que la acetilcolina, matando las larvas a medida que eclosionan de los huevos en el tracto gastrointestinal, por lo que las larvas no ingresan al organismo animal y por consiguiente el hígado y los pulmones no son dañados por la migración larval. El pamoato de oxantel es altamente efectivo contra ancylostomas y trichuris y posee poca actividad contra áscaris. Contrariamente al oxantel, el pirantel es muy efectivo contra áscaris y no contra trichuris, y posee la misma actividad contra ancylostomas. La combinación de ambas

drogas ha sido extensamente probada en humanos para el tratamiento de la helmintiasis múltiple siendo recomendada como la combinación de mayor eficacia y mejor tolerancia. Las dosis bibliográficas recomendadas para humanos son de 10 mg/kg de peso de cada uno de los principios activos.

El praziquantel causa una fuerte contracción tetánica de la estróbila, lo que distoca al parásito del intestino. Se produce además una alteración del tegumento del parásito que determina su pérdida de resistencia a las enzimas intestinales. Ambos eventos se producen a los 30 segundos luego del contacto con la droga.

Contraindicaciones: No posee.

Fórmula: Cada comprimido contiene: Pirantel base (como pamoato) 12,5 mg; Oxantel base (como pamoato) 12,5 mg; Praziquantel 6,24 mg; Excipientes c.s.p. 300 mg. Cada 100 g contiene: Pamoato de Pirantel 12,00 g; Pamoato de Oxantel 11,63 g; Praziquantel 2,08 g; y Excipientes c.s.p. 100 g.

Conservar entre 4 y 35° C. No congelar. No refrigerar.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al Médico Veterinario. **En Uruguay:** Eliminar los envases vacíos en el centro de acopio más cercano, según corresponda. **En Argentina:** Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Consultas en caso de intoxicación: Centros Toxicológicos: **Argentina:** CNI Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Colombia:** 018000-916012. **Costa Rica:** CNI Tel. 223-1028. **Ecuador:** Centro de Inf. y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX): 1800-VENENO (836366) a Nivel Nacional. **El Salvador:** Hospital San Rafael Tel. 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT Tel. (502) 22513560-22320735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **México:** SINTOX 01800-009-2800. **Nicaragua:** Centro Nac. de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289-7150/3328. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Rep. Dominicana:** CIDI. Tel.: (1809) 562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Elaborado y distribuido por **LABORATORIOS KÖNIG S.A.** Uruguay 720. B1868BAB. Avellaneda. Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com. Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, M.V. M.P. 2.216. Imp. y Dist.: **En Uruguay: KÖNIG URUGUAY S.A.** García Lagos y Camino al Paso Hondo, Col. Nicolich, Canelones, Tel. 598 2698 3343. Dir. Téc. Dr. Raúl Lettes. direccionatecnica@koniglab.com. MGAP Cert. N° 5149. **En Bolivia: VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Parque Industrial Av. Transversal 7 Mza. Pl 28 Lote 1 Esq. Diagonal 3, Santa Cruz. TEL.: (03) 352-0261 Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. SENASAG Reg. CR PUV-F 007756/17. **En Colombia: RIVETO S.A.S.** Cra 35 # 8 A 66, OI 202, Medellín. Tel. +57 317 662 2229. Reg. ICA N° XXXX. **En Costa Rica: DISTRIVET S.A.** Olitobodegas Barreal, Bodega 19, 400 N Pepsi, Barreal, Heredia Tel. 4010-0212 Dir. Téc. Dr. Heiner Hernández Avila. Reg. MAG N° xxx. **En Ecuador: ECUAQUIMICA**, Av Italo Km 1.5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel. 022 861 690. N° 3A2-9655-AGROCALIDAD. **En El Salvador: RHEMA** Residencial Tazumal av. los Bambúes Polígono # 3 Casa # 4 San Salvador. Regente Resp.: M. Belén Quintanilla de Fernandez, M.V., Id. Profesional N° 295. **En Guatemala: SUMINISTROS PORCINOS S.A.** 3ª. Av. 41-60, zona 12 Col. Monte María I Centro empresarial Monte María, Bodega 104. Tel. (502) 2479 1568 / 0066. **En Honduras: AGRIVETSA S.A.** Barrio La Bolsa, frente al 3er portón de Soptravi, Comayagüela, MDC Honduras. Tel.: (+504) 22256903. Médico Reg.: Dra. Nadienka Casco. Cert. N° xxx. **En México: AZDOLVET, S.A.** de C.V. Blvd. Condado de Sayavedra 250, Cdo. de Sayavedra, Atlixpan, CP 52938. Tel 53 08 7337. Dir. Téc. MV Marco Alemán. Reg. S.A.G.A.R.P.A. N° Q-9595-XXXX. **En Nicaragua: INVERSIONES ANTARES S.A.** Carretera Norte Km 8 ½ de los semáforos de la Subasta 200 mts al oeste, Managua. Dir. Téc.: Dr. Jorge A. Sobalvarro Barquero. IPSA Cert. N° 11.230. **En Panamá: DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel.: 507-2205821. distribvet@cableonda.net. Resp. Téc. Dra. Enilda Pinto Id. 728. M.I.D.A. Reg. N° xxx. **En Paraguay: CRESUR S.A.** Gral. Delgado N° 747 esquina Patricio Escobar. Lambaré- Paraguay. Tel.: +59521901000. Asesor Técnico. Dra. Alicia Escobar N° Reg. Prof. 1882. Reg. SENACSA N°: 5.226. **En Perú: GLOBALVET S.A.C.** Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima. Tel. (511) 719-0377. Reg. N°: F08 21.1.0669. **En Rep. Dominicana: FLEXEMPAQUES S.R.L.** Calle 16 de Agosto N°1. Los pepines, Santiago de los Caballeros, Santiago. Tel.: (809) 241-3095/ 233-3222. Ministerio de Agricultura. Cert. N° 8149. **En República Bolivariana de Venezuela:** N° de Reg. INSAI2041PI33N0716960. **GLOVETZ C.A.** Rif: J-40000322-9. Estado de Lara, ZP3001. Tel. (58) 25-1415-5148, glovetzjr@gmail.com. As. Téc.: M.V. José Ramos. CPE. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo prescripción del Médico Veterinario. Venta con receta veterinaria. En Ecuador: Venta Libre. En Colombia: Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

En Argentina:
 SENASA Cert. N° 87-507
 Estab. Elab. N° 5.580
PA 09061-V21

