

PROSPECTO GLYPONDIN 4 MULTIMINERAL

MEDIDAS: 21 cm de ancho x 12,8 cm de alto (Abierto) 5.3 cm de ancho x 12.8 cm de alto (Cerrado) Diámetro interno marbete: 2.3 cm Diámetro externo marbete: 3,55 cm

Margen suprior marbete: 0,9 cm





C: 0 - M: 100 Y: 80 - K: 0

Preventivo y curativo en casos de deficiencias de zinc, manganeso y selenio en bovinos. Optimiza la producción, la función reproductiva y el sistema inmune.

FÓRMULA: EDTA Disódico Manganeso. 7,10 g%; EDTA Disódico Zinc, 24,45 g%; EDTA disódico Cobre, 9,38 g%; Selenito de Sodio, 1,10 g%; excipientes y vehículo acuoso estéril c.s.p 100 mL. Aporte mineral: Zinc: 40mg/mL; Cobre: 15mg/mL; Manganeso: 10mg/mL; Selenio: 5mg/mL, DOSIS: Indicada para todas las categorías en bovinos. 1mL cada 100 kilos de peso vivo.

VÍA DE APLICACIÓN: Aplicación subcutánea exclusivamente.

PROGRAMA DE SUPLEMENTACIÓN RECOMENDADO: Toros: 3 veces por año.

Vacas - carne: 4 semanas antes del servicio; 4 semanas antes del parto. Vacas - leche: 4 semanas antes del parto: 4 semanas antes de inseminación; 4 semanas antes del período de seca.

Terneros: Una aplicación a las 24 horas de nacido; una aplicación al destete.

Vaquillonas: Cada especialmente antes del servicio.

ADICIONAL: Inducción a feed lots, antes o durante un cambio de alimentación, sequía, precipitaciones excesivas, frío, calor, y en el transporte y manejo. Indicado para ser aplicado junto con la vacuna antiaftosa.


FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Según criterio del profesional.


RESTRICCIONES DE USO: El producto empleado según las recomendaciones de uso no posee restricciones

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:

Confirmar la deficiencia de cobre y/o selenio. No aplicar cuando la pastura tiene un alto contenido de selenio v/o cobre. No aplicar cuando se suministra selenio v/o cobre por otra vía. No utilizar junto con suplementos granulados o fertilizantes de selenio, sin el consentimiento Veterinario. No administrar en animales con enfermedades hepáticas, fasciolasis o que estén consumiendo plantas que pudieran producir toxicidad hepática. Utilizar con precaución en animales debilitados o enfermos. Aplicar el producto en condiciones asépticas. No

aplicar a terneros recién nacidos, en los casos que se hava suplementado a las madres con cobre antes del parto. No aplicar junto a antiparasitarios de la familia de Avermectinas, Milbemicinas como tampoco Benzimidazoles, entre otros. No aplicar junto con vacunas cuya compatibilidad no esté justificada dentro de las 48 horas anteriores o posteriores a la administración del producto. La dosis tóxica del cobre puede corresponderse a tres veces la dosis terapéutica contenida en este producto, la doble dosificación puede afectar la salud de los animales. Evitar procedimientos de manejo fuertemente estresantes tales como descorne y castración dentro de las 48 horas anteriores al tratamiento. El sitio de





Zn

Se Mn

aplicación óptimo es el hueco existente por detrás de la paleta por vía subcutánea únicamente. No utilizar el producto por vía intramuscular o endovenosa. Emplee jeringas bien calibradas, aguja 12 x 18 en animales adultos y 10 x 18 en terneros, ajuste la dosis al peso del animal. Debe ser administrado bajo la supervisión de un veterinario.

Conservar a temperatura entre 15 y 35° C. No congelar. No refrigerar. En Perú entre 15° y 30° C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

CENTROS TOXICOLÓGICOS: Argentina: Ctro.

Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Inf. y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX): 1800-VENENO (836366) a Nivel Nacional Honduras: Llamar o acudir al médico, Panamá: CIMET Tel: (507) 269-2741. Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. República Dominicana: CIDI. Tel: (1809) 562- 6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Rep. Bolivariana de Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.





En Argentina:

SENASA Cert, Nº 17-940

SESNASA Cert, Nº 17-940

SESTADA Cart, Nº 17-940

SESTADA CARTONIOS KÖNIG S.A. Uruguay 720, Elaborado y distribuido por LABORATORIOS KÖNIG S.A. Uruguay 720, Elaborado y distribuido por LABORATORIOS KÖNIG S.A. Uruguay 720, Elaborado y Avellaneda. Buenos Aires Tel. (011) 4708-4141. consultateonica@koniglab.com Dir. Teo. Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M. P. 2216. En Uruguaya MGAD Nº 2019400655. Imp. visito por VETRORIOS S.A. Garcia Lagos y Carnino al Paso Hondo. Col. Dir. Genico: Dr. Raúl Leires, En Bolivia: SENASAG CR-PUV Mº xxx Imp. visit. por VETRORIOMICA BOLIVIANA S.R.1. A. v. Pira Nº 93, Santa Cruz. Tel.: (03) 352-0261. Dir. Teonico: Enesto Rojas V. En Euador. Dir. Jenico Ernesto Rojas V. En Euador. Regila Dir. Jenico Ernesto Rojas V. En Euador. Br. Jenico Ernesto Rojas V. Jenico Regilas V. A. A. Harrio La Bolas Intenta Star Portón de Soptiava V. Jenico Rojas V. P. Pr. 1862, P. S. Elabora V. Pr. 1864, Pr

Glypondin 4 FÁCIL con receta veterinaria **iii König**