

**ESTUCHE SINGESTAR MP HI-JECT**  
**MEDIDAS: 86 mm de ancho x 148 mm de alto.**

**PANTONE**  
**Solid Coated**  
**152 C**

**PANTONE**  
**Solid Coated**  
**185 C**

USO VETERINARIO

**5%**

# Singestar<sup>®</sup> MP

## Hi-Ject

INCLUYE **SWAB**  
 PARA DESINFECTAR  
 LA ZONA




### Medroxiprogesterona

Anticonceptivo para perras  
 y gatas · Suspensión acuosa  
 estéril inyectable · Jeringa  
 prellenada con aguja ultrafina  
 Inyectable subcutáneo

**CONT.NETO:1 mL**

Venta con receta veterinaria  
 Industria Argentina



**König**

PA03083-V15

### UTILICE EL SWAB PROVISTO PARA DESINFECTAR LA ZONA DE APLICACION



**SINGESTAR MP HI-JECT** actúa inhibiendo la secreción de gonadotropinas hipofisarias impidiendo así la maduración de los folículos para el control del ciclo estral.

**MEDROXIPROGESTERONA** (Microcristales de liberación controlada)

**Fórmula:** Cada 100 mL contiene: Acetato de medroxiprogesterona 5.00g % P/V. Cada mL de suspensión contiene: acetato de medroxiprogesterona 50 mg; excipiente acuoso c.s.

**Dosis:** **Caninos y felinos:** 1 mL por vía subcutánea. Agitar antes de usar.

**Conservación:** En Argentina: Conservar por debajo de los 30° C. En Perú: entre 15° y 30° C. En Ecuador: entre 4° y 35° C. No congelar. No refrigerar.

**INDICACIONES:** Postergar o retardar el celo en perras y gatas que se encuentran en anestro. Este efecto puede darse en las siguientes circunstancias:

- Cuando la gestación o el parto significan un riesgo para la salud del animal.
- Cuando el estado de salud no permite efectuar una ovariectomía u ovariohisterectomía.
- Cuando no se desean las crías.
- Para lograr un distanciamiento entre camadas en hembras reproductoras.
- Vacaciones, viajes, presentación a exposiciones, temporada de caza.
- Albergue de machos y hembras en forma conjunta.

Previo a la administración de SINGESTAR MP HI-JECT, deberá determinarse el estadio del ciclo estral en que se encuentra el animal, a través de una adecuada anamnesis o por medio de un frotis vaginal.

Para lograr un control efectivo en perras, la aplicación de SINGESTAR MP HI-JECT deberá efectuarse 20 a 30 días antes del estro esperado. En gatas, se administrará 3 a 6 semanas después del celo o una semana después del destete de los gatitos, correspondiendo en ambos casos a la etapa del anestro. Es necesario considerar que en un hábitat totalmente doméstico, las gatas pueden no presentar período de anestro.

**DURACION DEL EFECTO:** Pruebas clínicas han demostrado que una sola aplicación de SINGESTAR MP HI-JECT permite controlar el estro por períodos superiores a los 6 meses. La demora en la aparición del estro post aplicación resulta variable, con un promedio de aproximadamente 10 meses. En casos aislados, el intervalo máximo observado fue de 22 meses. Cuando se requiera control permanente del estro, SINGESTAR MP HI-JECT deberá administrarse cada 6 meses. Cabe destacar que, al suspender el tratamiento, el estro podrá presentarse en un período de tiempo no predecible con exactitud.

**CONTRAINDICACIONES:** Al igual que todos los preparados a base de progestágenos, SINGESTAR MP HI-JECT no puede ser administrado cuando existan evidencias de trastornos uterinos o mamarios de cualquier índole, debiéndose descartar previamente la presencia de neoplasias. No administrar a animales en período de proestro, estro o metestro, ya que la alta concentración de hormonas estrogénicas presentes en dichas etapas, aumenta el riesgo de trastornos uterinos relacionados a la administración de progestágenos. No administrar a animales que no hayan alcanzado la pubertad.

■ SENASA Cert. N° 86.070  
 Estado, etiq. N° 5.580

50 mg / mL



**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** En algunas perras, luego de la administración de SINGESTAR MP HI-JECT, puede producirse desarrollo mamario y lactación, en esos casos se recomienda no repetir el tratamiento. Esta predisposición es mayor en la raza galgo.

Se recomienda no aparear a las hembras tratadas con SINGESTAR MP HI-JECT, hasta el segundo celo normal post-tratamiento.

Debido a la posible aparición de alteraciones de pigmentación en el punto de inyección, se recomienda aplicarla en un lugar poco visible, como la cara interna del muslo o el pliegue medial del flanco.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Los efectos secundarios más frecuentes asociados con la administración de progestágenos consisten en trastornos uterinos: hiperplasia quística del endo- metrio, mucometra y píometra y trastornos mamarios: hiperplasia mamaria benigna. Generalmente, estos cambios inducidos por la droga son reversibles si se suspende la administración de la misma.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Consulte al médico veterinario. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

**Centros Toxicológicos:** Argentina: Ciro, Naz, de Intoxicaciones Tel. 0800-233-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Costa Rica: Centro Naz, de Intoxicaciones Tel. 2225-1025. Ecuador: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATO). 1800-VENUEO (833266). El Salvador: Hospital San Rafael Teléfono 2525-8000 ext 148 y 149. Guatemala: CIAT Tel. (502) 2251550 (502) 2232-0735. Honduras: Llamar o acudir al médico. México: Serv. de Int. Toxicología SINOTOX 01800-008-2600. Nicaragua: Centro Naz, de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289-7150 289-3322. Panamá: CIOMET Tel. (507) 269-2741. Paraguay: Ciro, Toxicología Naz. Tel. (021) 204-800 (ext. 10711) 204-818. Perú: CIOTOX Tel. 0800-1-5040. República Dominicana: CIDL Tel. (1809)562-6001 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Rep. Bolivariana de Venezuela: UCY Tel. (212) 605-2505.

**LABORATORIOS KÖNIG S.A.** Uruguay 720, El Bosque, Av. Montevideo, Buenos Aires Tel. (011) 4036-1441 corelab@comercialkoning.com. Ur. Soc. De. Oscar Berra, M.U.M.P. 2216. En Uruguay: Rep. MBAP N° 4585, Imp. y dist. **KÖNIG URUGUAY S.A.** García Lagos y Camino al Paso Hondo, Colonia Woolrich, Canelones: 989 2830 3343, Doc. Tec. Dr. Raúl Leites, Email: directoriocentral@comercialkoning.com. En Bolivia: SENASA 05-0104-00039204, Imp. y dist. **VETERINARIA BOLIVIANA S.R.L.** Parque Industrial Avenida Transversal 7 Maíz, P.O. 28 Lote 1 Esq. Diagonal 3, Santa Cruz, TEL: (03) 332-0261 Doc. Tec. Ernesto Rojas y. En Costa Rica: Rep. Y. y v. Imp. y dist. **FAVIVET S.A.** 200 Norte 15, Costa del Atlántico, San José. Teléfono Tel. 4011-2012 En Ecuador: N° 981-3-9671-AGROCALIDAD, Imp. y dist. **ECUADUQUIMA**, Av. José Sanguino Castro y Av. Juan Tarso Moreno, Km 1,8, Rd. 102-505940, Guayaquil - Ecuador. En El Salvador: Imp. y dist. **BIENESTAR** (residencial) Equival a nivel de Avenida Benjamín Páez # 3 Casa # 4 San Salvador, El Salvador, Agente Responsable: María Ballea Quintanilla de Fernández, Médico Veterinario, Identificación Profesional N° 255, En Guatemala: Rep. MGA, av. Imp. y dist. **WIMWET S.A.** 2da Calle 1-40 Sector P1, San Cristóbal, Zona de Miraflores, Guatemala, Responsable Técnico César Humberto Cardona Orellana, En Honduras: Imp. y dist. **ADMIVET S.A.** Rep N° PP-4922, Residencial Palma Real 1 Esq. Obispo C/No. 45, Tegucigalpa, Tel. (00502)234370. Méj. Rep. Dra. Bárbara Casco, En México: Rep. S.A.G.A.R.S.A. N° 0-9585-cox, Imp. y dist. **AZDOLVET S.A.** de C.V. S.M.A. Condado de Sayulita 250, Cdo. de Sayulita, Arriaga, México, CP 28306, Tel. 52 98 7633, Doc. Tec. M.V. Marco Martín, En Nicaragua: PSC Gen. N° 1.231, Imp. y dist. **WIVET S.A.** Antares S.A. Carretera Norte Km 8 1/2 de los sembrados de la Subzona 200 mts al oeste, Managua, Managua, Doc. Tec. Dr. Jorge A. Solórzano Barquero, En Panamá: M.U.D.A. Rep. N° 028-10, Imp. y dist. **OSTIVET S.A.** Juan José Calle 14, Tel. 300-229921, desmet@calabandazel. Responsable Técnico Dra. Emilia Pinto R. 726, En Paraguay: Rep. SENASA N° 5219, Imp. por **CRASUR S.A.** Grid, Diagonal N° 747 Rep. Parque Escobar RUC: 00000252- Tel. 021 58103, Asesor Técnico, Dra. Alicia Serrano N° Rep. Perú: 1983, En Perú: Imp. y dist. **GLOBALVET S.A.C.** Rep. SENASA N°: F16.42.10281, Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Noronga 2da Etapa, San Miguel, Lima, Perú, Tel. (51) 719-1027, En República Dominicana: Ciro, N° 18075, Imp. y dist. **ELEFARMACIAS S.A.** Calle 16 de Agosto 111, Los peñones, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana, Tel. (809) 341-3065 233-2022, En la Rep. Bolivariana de Venezuela: Rep. N° NISA 204FR3007658 - Imp. por **GLUNET S.A.** N° 4000229, Estado de Lara 29501, Tel. 6692-455148, Email: gh@glunet.com, Asesor Técnico N.V. José Palacios, OFE.

