

ETIQUETA BACTROVET PASTA 1.2 KG
MEDIDAS: 347 mm de ancho x 127 mm de alto.

PANTONE
Solid Coated
280 C

SENASA Cert. N° 11-210
Establecimiento Elaborador N° 8596

Fabricado por **BINKA S.A.** Méjico 1060, B1868BDF, Avellaneda, Buenos Aires. Distribuido por **LABORATORIOS KÖNIG S.A.** Uruguay 720, B1868BAB, Avellaneda, Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, M.V. M.P. 2216. **En Uruguay:** MGAP N° 2015A00225. Imp. y dist. por **KÖNIG URUGUAY S.A.** García Lagos y Camino al Paso Hondo, Col. Nicolich, Canelones 598 2698 3343. Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. direcciontecnicauy@koniglab.com. **En Bolivia:** SENASAG REG. PUV-F 006894/16. Imp. y dist. por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Parque Industrial Av. Transversal 7 Mza. Pl 28 Lote 1 Esq. Diagonal 3, Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261 Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. **En Ecuador:** Registro AGROCALIDAD: N°XXX. Imp. y dist. por **ECUAQUÍMICA C.A.** Av. J.S. Castillo y J. Tanca Marengo, Guayaquil. Tel. 02 5505040. **En Honduras:** Cert. N° xxx. Imp. y dist. **AGRIVET S.A.** Barrio La Bolsa, frente al 3er portón de Soptravi, Comayagüela, MDC Honduras. Tel: (+504) 22256903. Médico Regente: Dra. Nadienka Casco. **En Panamá:** M.I.D.A. Reg. N°RF-706214. Imp. y dist. por **DISTRIVET S.A.**, Juan Díaz calle 1b, Tel.: 507-2205821 distrivet@cableonda.net Resp. téc. Dra. Enilda Pinto ID. 728. **En Paraguay:** N° de Reg: 13698. Imp. por **CRESUR S.A.** Gral. Delgado N° 747 esq. Patricio Escobar RUC: 80014725-1 Tel: 021 901000. Asesor Técnico. Dra. Alicia Escobar N° Reg. Prof. 1882. **En Perú:** SENASA Reg. N° F.87.52.I.0219. Comerc. por **GLOBALVET S.A.C.** Calle Mario Valdivia 180 Urb. Maranga, San Miguel, Lima. Tel.: (511) 7190377. **En República Dominicana:** Ministerio de Agricultura. N° de reg.: 10971. Dist. **FLEXEMPAQUES S.R.L.** Calle 16 de Agosto N°1, Los pepines, Santiago de los Caballeros. Tel.: (809) 241-3095 / 233-3222. **En República Bolivariana de Venezuela:** Reg. M.A.T. S.A.S.A. XXX. Imp. por **GLOVETZ C.A.** Rif: J-40000322-9. Estado de Lara, ZP3001. Tel. (58)25-1415-5148. glovetzjr@gmail.com. Asesor Téc.: M.V. José Ramos. CPE. Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.



QH9027-V1



7

7914321890200

Lote: RESERVA
Elab.: DE LACA
Vto.:

CURABICHERA EN PASTA

**200 g
GRATIS**

bactrovet® plata
Pasta


Sulfadiazina de plata • Aluminio • Imidacloprid • Cipermetrina



**ANTIMIÁSICO, HEMOSTÁTICO Y
CICATRIZANTE DE ALTA ADHERENCIA.**

REPELENTE • BACTERICIDA • ANTIFÚNGICO • EPITELIZADOR

**EFFECTO LÁMINA
PROTECTORA**



Cont. neto: 1,2kg

Venta sin receta en locales con
asesoramiento profesional veterinario
INDUSTRIA ARGENTINA

König

bactrovet plata pasta

- Cura la bichera y repele las moscas.
- Previene y cura todo proceso infeccioso de las heridas.
- Es hemostático.
- Favorece la cicatrización.
- De alta adherencia.

Fórmula: Cada 100 gramos contiene: sulfadiazina de plata 0.1 g; aluminio 5.0 g; imidacloprid 0.7 g; cipermetrina 3.0 g; excipientes c.s.

Indicaciones: tratamiento de todo tipo de heridas en todas las especies. Tratamiento y prevención de bicheras en intervenciones quirúrgicas como castración, descole, descorne, ombligo de los terneros, rajaduras de casco, heridas de cualquier origen. Heridas en general.

Especies animales a las que se destina: Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y caninos.

Agentes etiológicos susceptibles: Bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la sulfadiazina y larvas de moscas productoras de miasis: *Lucilia sp.*; *Callitroga sp.* y *Sarcophaga sp.*

Aplicación: Colocar la pasta en capas sobre el área a tratar, asegurando la penetración del producto dentro de la herida. Aplicar también alrededor de la misma, formando un halo de 5 cm. El número de aplicaciones depende del tipo de herida y de las condiciones ambientales. En caso de herida de castración en grandes animales se recomiendan dos aplicaciones separadas por 72 horas, como mínimo. En la

prevención de las bicheras del ombligo basta con una sola aplicación dentro de las 24 horas del nacimiento. La duración del tratamiento depende del tipo de afección y de la complicación de la herida, se recomienda continuar la aplicación hasta la cicatrización. En caso de usarse como preventivo es suficiente una sola aplicación.

Tiempo de espera: No posee. En Uruguay: se autoriza su uso con un tiempo de espera para faena de 10 días. No posee restricciones en animales lecheros.

Precauciones: Producto tóxico. Aplicar con guantes. Lavarse las manos luego de su aplicación con agua y jabón. No fumar, comer ni beber durante su uso.

En caso de contacto con los ojos lavar profundamente con agua durante 15 minutos y consultar al médico. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. No aplicar a gatos. Los envases utilizados deberán ser descartados siguiendo la legislación local vigente.

Síntomas de intoxicación: excitación, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración y miosis. En caso de intoxicación se debe instaurar tratamiento sintomático.

Centros Toxicológicos: **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333- 0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) 1800-VENENO (836366) a Nivel Nacional. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204- 800/532. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** CIDI. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Rep. Bolivariana de Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Conservar por debajo de 30° C. No refrigerar. No congelar. En Perú y Ecuador: conservar entre 15 y 30°C.

Atención: lea el rótulo