


**ETIQUETA RANDON TITANIUM ARG. 500 mL**  
**MEDIDAS:** 230 mm de largo x 85 mm de alto

PANTONE  
Solid Coated  
2612 C

C: 0 - M: 100  
Y: 80 - K: 0



**FÓRMULA:** Cada 100 mL contiene: Ivermectina 3,15 g; Excipientes c.s.p. 100 mL.

**INDICACIONES:** Tratamiento de las parasitosis gastrointestinales, piojos chupadores, ácaros de la sarna y garrapata común del bovino.

**ESPECIE:** Bovinos.

**ESPECTRO DE ACTIVIDAD:**

**Parásitos gastrointestinales:** *Ostertagia ostertagi* (adultos L3 y L4, incluyendo inhibidas; *Ostertagia trifurcata*; *Haemonchus placei* (adultos, L3 y L4); *Trichostrongylus axei* (adultos y L4); *Cooperia pectinatus* (adultos y L4); *Cooperia curticei* y *Mc masteri* (L3); *Oesophagostomum radiatum* (adultos, L3 y L4); *Nematodirus helvetianus* (adultos); *Nematodirus spathiger* (adultos).

**Parásitos externos:** Ácaros de la sarna (*Psoroptes communis* variedad bovis) y garrapata común del bovino (*Boophilus microplus*).

**ADMINISTRACIÓN:** Aplicar utilizando material estéril y desinfectar el sitio de inyección. Limpiar el tapón con alcohol para prevenir la contaminación del contenido del frasco. Inyectar en forma subcutánea en un pliegue por delante o detrás de la paleta. Agitar bien durante un minuto antes de dosificar, manteniendo cierta periodicidad de agitación en el transcurso de las dosificaciones.

**DOSIS:** 1 mL / 50 Kg de peso vivo (0,63 mg Ivermectina / Kg de peso vivo). Una sola aplicación es suficiente para combatir infestaciones de sarna psoróptica y si fuera necesario repetir a criterio del profesional actuante.

Aprobado por SENASA como Garrapaticida Bovino para ser utilizado en zonas de control e indenne: focos de reinfestación con la indicación del Programa de Lucha contra la Garrapata (Resolución N° 382/2017), utilizando el poder residual obtenido en la Prueba oficial. Prueba biológica realizada en el campo experimental Camba Punta, Porcentaje de eficacia: 99,31. Poder Residual: 35 días. Altamente efectivo contra nematodos, porcentaje de reducción: >98.

**TIEMPO DE ESPERA:** Bovinos de Carne: 57 días.




1 mL / 50 kg

**Ivermectina**  
Endectocida interno-externo  
Fórmula tixotrópica - Acción prolongada

**3,15 %**

**Randon®**  
TITANIUM

USO VETERINARIO



AGÍTESE BIEN  
ANTES DE APLICAR



**CONT. NETO: 500 mL**

Venta con receta veterinaria  
Industria Uruguaya



**CONTRAINDICACIONES:** El uso en conjunto con benzodiazepínicos, potenciará los efectos gabaérgicos de ambas drogas, aumentando el riesgo de afectar el Sistema Nervioso Central de los mamíferos (Ungemach 1994). Evitar la sub-dosificación, se recomienda calcular la dosis exacta del producto según peso vivo del animal. El uso racional del antihelmíntico evita el desarrollo de resistencia. Antes de utilizar un producto que contenga Ivermectina, se recomienda un asesoramiento profesional veterinario, para lograr un máximo control de los parásitos y disminuir el riesgo de provocar resistencia. El producto no afecta la preñez. Se probaron dosis dobles en hembras preñadas en distintos momentos de la gestación: el desarrollo embrionario y nacimiento de los terneros no presentó ninguna anomalía. No aplicar en animales muy debilitados o sometidos a estrés muy intenso. No debe usarse en vacas lecheras cuyo producto tenga como destino el consumo humano.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** Debe aplicarse por vía subcutánea únicamente. No usar por vía intramuscular o endovenosa. En bovinos se recomienda no aplicar más de 10 mL por punto de inyección. No fumar ni comer durante la manipulación. Evitar el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**Centros Toxicológicos:** Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Guatemala: CIAT Tel. (502) 22513560 (502) 2232-0735. Ecuador: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX): 1800-VELENO (836366) a Nivel Nacional. Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. República Bolivariana de Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

No contaminar fuentes de agua. Los envases deben ser eliminados según normas locales vigentes. Conservar entre 15° C y 35° C, al abrigo de la luz solar. No refrigerar. No congelar.

Fabricado por: Laboratorios Pasteur S.A. N° 18 Emancipación 5137, Dir. Téc. Quím. Washington Díaz, Mat. 15009, Industria Uruguaya. En Argentina: Imp. y distribuido por LABORATORIOS KÖNIG S.A. Uruguay 720, (B1868BAB) Buenos Aires, Argentina, Tel.: (011) 4208-4141. Director Técnico: Dr. Oscar Hortas, M.V.M.P. 2216. Email: consultatecnica@koniglab.com

Lote / Elab. / Vto.: Ver en envase / estuche.

SENASA Cert. N° 17-009  
Est. Imp. N° 6978

