

Venta bajo receta  
Industria Argentina



# kuramicina® BRONCOPULMONAR

(Oxitetraciclina y Flunixinina)  
ANTIBIÓTICO / ANTIINFLAMATORIO / ANALGÉSICO / ANTIPIRÉTICO

USO VETERINARIO

**FÓRMULA:** Cada mL contiene: flunixinina base, 20 mg; Oxitetraciclina base, 200 mg y excipientes c.s.p. **KURAMICINA® BRONCOPULMONAR** se administra en una sola aplicación y posee efecto antibiótico, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Se presenta en una solución estéril estable, lista para usar.

## ESTRUCTURAS QUÍMICAS:



## INDICACIONES:

**KURAMICINA® BRONCOPULMONAR** está indicada principalmente en el tratamiento de afecciones respiratorias bacterianas asociadas a *Paustarella spp.*, en bovinos, ovinos y porcinos, debido a la efectiva acción antimicrobiana de la oxitetraciclina contra este patógeno.

También esta indicada para el tratamiento de las enfermedades causadas por bacterias GRAM – (*Bordetella bronchiseptica*; *Escherichia coli*; *Pasteurella multocida*; *Klebsiella pneumoniae*);

GRAM + (*Streptococcus pneumoniae*; *Streptococcus pyogenes*; *Staphylococcus aureus*); microorganismos de los grupos Chlamydiae, Mycoplasmataceae, Rickettsiae (*Anaplasma spp.*) y algunos hongos (*Dematophilus congolensis*).

La flunixinina de **KURAMICINA® BRONCOPULMONAR**, es un potente antiinflamatorio no esteroideo, analgésico y antipirético, que actúa en el control de la pirexia.

Esta indicado para las siguientes patologías:

**En Bovinos:** Neumonía por *Pasteurella ssp.* (fiebre del embarque), metritis, septicemia, enteritis bacterianas, actinobacilosis, heridas infectadas, infecciones articulares. Prevención y tratamiento de infecciones genitales u obstétricas.

**En Ovinos:** Neumonía por *Pasteurella ssp.*, prevención de infecciones post parto, enterotoxemia, gangrena gaseosa (*Clostridium spp.*), clamidiosis, actinobacilosis, nefritis, cistitis, mastitis, otras infecciones causados por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.

**En Porcinos:** Neumonía por *Pasteurella ssp.*, bronconeumonía, síndrome Mastitis-Metritis Agalactia (MMA), control de rinitis atrófica, mastitis, metritis, leptospirosis, diarrea de los lechones, onfaloflebitis, otras infecciones causadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.

## DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar **KURAMICINA® BRONCOPULMONAR** por vía intramuscular. La dosis indicada es de 1 mL por cada 10 kg de peso para todas las especies (20 mg de flunixinina y 200 mg de oxitetraciclina cada 10 kg). No administrar más de 20 mL por punto de aplicación en bovinos adultos. En terneros y ovinos aplicar no más de 5 mL por sitio de inyección. En porcinos hasta 10 mL por punto de aplicación. En casos de lechones menores de 10 kg de peso, la dosis es de 1 mL por animal.

## Esquema Terapéutico:

En tratamientos preventivos como curativos, la frecuencia indicada es de una sola aplicación. Si se considera necesario puede repetirse a los 3 a 5 días, según el criterio del veterinario responsable.

La dosis es 1 mL por cada 10 kg de peso,  
para todas las Especies



Peso del Animal (Kg.)	Volumen de mL a aplicar
20	2
25	2,5
50	5
75	7,5
100	10
150	15
200	20
250	25
300	30
350	35
400	40
450	45
500	50
550	55
600	60

## CONTRAINDICACIONES:

**KURAMICINA® BRONCOPULMONAR** no posee contraindicaciones si se utiliza de acuerdo a las indicaciones del prospecto.

El producto no debe ser administrado por vía endovenosa. No será aplicado en las situaciones que se mencionan a continuación: en hipersensibilidad a la oxitetraciclina y/o a la flunixinina; en presencia de trastornos gastrointestinales, hepáticos, renales y en cólicos asociados a íleo.

No debe administrarse en concomitancia con: penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos y corticoides.

No administrar en animales en lactación; en hembras gestantes; en vacas de producción de leche destinada al consumo humano; y en animales menores de 3 días de edad.

## PRECAUCIONES:

Pueden producirse reacciones inflamatorias pequeñas en el punto de inyección a los 2 a 4 días post tratamiento, siendo más frecuente en animales menores de 100 kg. Excepcionalmente en animales hipersensibles puede ocasionar reacciones alérgicas o anafilácticas. No se ha determinado el efecto de Kuramicina BRONCOPULMONAR en hembras preñadas, por lo que no debe administrarse en estos casos. Debe evitarse la inyección intraarterial de Kuramicina BRONCOPULMONAR ya que se han observado reacciones adversas al administrarlo por esta vía. Los síntomas consisten en: ataxia, incoordinación, hiperventilación, debilidad muscular y excitación. Sin embargo, dichas reacciones son fugaces y desaparecen sin necesidad de tratamiento. Por su capacidad por ligarse al calcio, puede provocar efectos cardiovasculares (arritmias), además de deposición en el tejido óseo y dientes.

## ADVERTENCIAS:

La sobredosificación con oxitetraciclina produce una necrosis hepática irreversible. No existen antidotos específicos.

La flunixinina no es tóxica a las dosis recomendada. En caso de sobredosificación puede observarse uno o más de los siguientes síntomas: depresión, anorexia, pérdida de peso, diarrea, vómitos, úlceras orales y gastrointestinales. La aparición de hipoalbuminemia es un indicador precoz de intoxicación.

En animales destinados al consumo humano, deben transcurrir 28 días entre el último tratamiento y la faena. No aplicar en bovinos cuya leche se destina a consumo humano.

**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.** En caso de ingestión accidental concurrir, con el prospecto, al centro toxicológico más cercano.

**Centros Toxicológicos:** Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel.: (04) 256-0300. El Salvador: Hospital San Rafael Tel.: (503) 2525-5800 ext. 148 y 149. Guatemala: CIAT Tel.: (502) 22513560 - (502) 22320735. Honduras: Llamar o acudir al médico. Panamá: CIMET Tel.: (507) 269- 2741. Perú: CICOTOX Tel.: 0800-1-3040. Paraguay: Ctro. Nacional de toxicología Tel.: (021) 220-418, 204-800 (int. 1011).

República Dominicana: CIDI. Tel.: (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel.: (02) 1722. Venezuela: UCV Tel.: (212) 605-2586.

## Presentaciones:

Frascos ampolla por 40, 100 y 250 mL.

## Conservación:

Conservar entre 4 y 35°C.

## Nota:

El laboratorio no se hará responsable del mal uso que pudiera darse al producto. Su aplicación debe estar controlado por un médico veterinario. La aparición de una ligera opalescencia en la solución no implica una disminución en la acción farmacológica del mismo.

## Información de contacto:

Para obtener asistencia técnica, contactarse con Laboratorios König.

**En Argentina:** Buenos Aires. Tel.: (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com Director Técnico Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136.



SENASA Cert. N° 14-052  
Est. Elab. N° 5.580

**En Argentina:** Elaborado y distribuido por Laboratorios KÖNIG S.A. Uruguay 720 (B1868B8B) Avellaneda, Argentina Tel.: (011) 4208-4141. consultatecnica@koniglab.com Director Técnico: Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136.

**En Uruguay:** Importado y distribuido por KÖNIG Uruguay S.A. San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel.: (0598) 2208-3920. Director Técnico: Raúl Leites. direcciontecnicay@koniglab.com

**En Bolivia:** Importado y distribuido por VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. Av. Pirai N° 493, Santa Cruz. Tel.: (03) 352-0261 Director Técnico: Ernesto Rojas V.

**En Ecuador:** Importado y distribuido por ECUAQUÍMICA C.A. Av. Llaló Km 1.5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Quito, Tel.: (022) 861-690. Director Técnico: Fausto Yáñez.

**El Salvador:** Importado y distribuido por SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A. De C.V. Edificio Avante, suite 5-01, BLVD. Luis poma, Sta. Elena, Antiguo Cuscatlan. Tel.: (503) 2505-5555/5565

**En Guatemala:** Importado y distribuido por SUMINISTROS PORCINOS, S.A. 3ª. Av. 41-60, zona 12 Col. Monte María I, Centro empresarial Monte María, Bodega 104. Tel.: (502) 2479-1568 / 2479 0066.

**En Honduras:** Comercializa y distribuye IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V. Residencial Monte Bello, Bl.43 casa # 34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel.: (0504) 2565-6847. Director Técnico: Abelardo Mejía Pineda.

**En Nicaragua:** AGROVETERINARIOS S.A. GROVET S.A. Jinotepe, Carazo Nicaragua de la Gasolinera Puma una cuadra al sur y media al este. Jinotepe, Carazo. Habilitación oficial: j0310000024863. Director Técnico: Orlando f. Acevedo Ortiz (mvz)

**En Panamá:** Importado y distribuido por DISTRIVET S.A., Juan Díaz calle 1b, Tel.: (507) 220-5821. distribvet@cablonda.net Director Técnico: Dra. Enilda Pinto ID. 728.

**En Paraguay:** Importado por CRESUR S.A. Av. J.F. Bogado 1482 RUC: 80014725-1 Reg. Alicia Escobar. ATC: (021) 333-407- Establecimiento 0100 0096 01 07 12 Tel.: de emergencias: (021) 204-908/9 - IPS: (021) 209-150.

**En Perú:** Importado y distribuido por GLOBALVET S.A.C. Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima. Tel.: (511) 719-0377. Alameda del corregidor 2720 Urbanización La Capilla, La Molina, Lima. Tel.: (511) 365-7625.

**En República Dominicana:** Distribuidora: FLEXEMPAQUES S.R.L. Calle 16 de Agosto N°1, Los pepines, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel.: (809) 241-3095/ 233-3222.

**En Venezuela:** Importado por Representaciones ADALCA, C.A. Rif: J-30295110-0. Tel.: (0241) 871-6071 / 871-7340, Valencia. Director Técnico: Carmen Cavet.

**KURAMICINA® BRONCOPULMONAR** es una marca registrada por Laboratorios König S.A.

FECHA DE LA REVISIÓN: Abril, 2015

  
www.koniglab.com



PA9305