


ETIQUETA VERMKON 4 L - FRENTE
MEDIDAS: 263 mm de ancho x 120 mm de alto.



ETIQUETA VERMKON 4 L - DORSO
MEDIDAS: 216 mm de ancho x 120 mm de alto.



ETIQUETADO:



**ETIQUETA Y CONTRA
EN BOBINAS SEPARADAS**


Naftalofos
Antihelmíntico para ovinos - Suspensión oral

15 %

Vermkon

APR

USO VETERINARIO



**LISTO PARA USAR
CON SÓLO AGITAR**
Exclusivo balón mezclador

CONT. NETO: 4 L
Venta con receta veterinaria
Industria Uruguaya



Elab. y Dist. por **KÖNIG URUGUAY S.A.** García Lagos y Camino al paso hondo. Colonia Nicolich, Canelones, Uruguay. Teléfono: (+598)2698 3343 Dir. Téc. Dr. Raúl Leites. Email: direcciontecnica@koniglab.com. Establecimiento N° 100, Industria Uruguaya. Reg. M.G.A.P. N° A5297.

En Argentina: Imp. y dist. por **LABORATORIOS KÖNIG S.A.** Uruguay 720, B1868BAB. Avellaneda, Buenos Aires Tel. (011) 4208-4141 consultatecnica@koniglab.com Dir. Tec. Dr. Oscar Hortas, M.V. M.P. N°: 2216. **En Bolivia:** SENASAG CR-PUV N° xxx. Imp. y dist. **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Parque Industrial Avenida Transversal 7 Mza. Pl 28 Lote 1 Esq. Diagonal 3, Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261 Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. **En Ecuador:** N° xxx-AGROCALIDAD. Imp. y dist. **ECUAQUÍMICA.** Av. José Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo, Km 1.8. Tel.: 02 5505040.; Guayaquil - Ecuador. **En Honduras:** Imp. y dist. **AGRIVETSA S.A.** Reg No. xxx. Residencial Palma Real, I Etapa, Bloque C No. 45. Tegucigalpa. Tel (504)22343170 Med Reg- Dra. Nadienka Casco. **En Paraguay:** Reg. SENACSA N° XXX. Imp. por **CRESUR S.A.** Gral. Delgado N° 747 esq. Patricio Escobar RUC: 80014725-1 Tel: 021 901000. Asesor Técnico. Dra. Alicia Escobar N° Reg. Prof. 1882. **En Perú:** Imp. y dist. **GLOBALVET S.A.C.** Reg. SENASA N°: xxx. Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, Perú. Tel. (511) 719-0377.

LOTE:
ELAB.: **reserva de laca**
VTO.:



Vermkon

APR

USO VETERINARIO

FÓRMULA: Naftalofos 15 g/P/V; Excipientes C.S.P.

INDICACIONES: Nematodocida: Actúa tanto en formas maduras como inmaduras de *Haemonchus contortus*; *Trichostrongylus axei*; *Trichostrongylus spp.*; *Ostertagia spp.* y en formas maduras de *Nematodirus spp.*

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: PARA PARÁSITOS DE ABOMASO E INTESTINO: 3 mL cada 9 kg de peso vivo (equivalente a 50 mg/kg de peso vivo de Vermkon). PARA PARÁSITOS DE ABOMASO (*Haemonchus contortus*): 1 mL cada 5 kg de peso vivo (equivalente a 30 mg/kg de peso vivo de Vermkon). Ver tabla adjunta. Una dosis es suficiente para lograr la desparasitación de los animales. El veterinario responsable del establecimiento determinará cada cuanto repetir el tratamiento según las condiciones de reinfestación imperantes. Se recomienda como mínimo desparasitar cada 120 días.

Parásitos de abomaso e intestino

Kg de peso vivo	Volumen en ml
18	6
27	9
36	12
45	15
54	18
63	21

Parásitos de abomaso (*Haemonchus contortus*)

Kg de peso vivo	Volumen en ml
15	3
20	4
30	6
40	8
50	10
60	12

QA9423

TIEMPO DE ESPERA: El tiempo que debe transcurrir entre el último día del tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano es de 14 días. No administrar en animales en producción láctea destinada a consumo humano.

ADVERTENCIAS: Agitar bien antes de administrar. No dejar estacionar el producto en el envase. Respetar las dosis indicadas. Tener precaución de no generar una falsa vía al administrar el producto. Permitir a los animales el acceso al agua luego de su tratamiento.

LEE ATENTAMENTE LA ETIQUETA: evitar la ingestión, el contacto con los ojos la piel. Utilizar guantes para la administración. No comer, beber o fumar durante la administración. Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas. No almacenar ni transportar junto a alimentos o productos destinados al consumo humano. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.

Si las molestias persisten consultar a un oftalmólogo. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión no inducir el vómito, acudir inmediatamente al médico con esta etiqueta. Grupo químico: Organofosforados. Antídoto: Atropina EV. Adultos 1-3 mg. Niños 0,05 mg. Repetir cada 5-10 min hasta atropinizar. Por una segunda vía administrar pralidoxima u obidoxima en forma lenta: Adultos 250 mg. Niños 4-8 mg. Evaluar realizar el lavado gástrico y administración de carbón activado. Descartar los envases vacíos en el centro de acopio más cercano. En Arg: Eliminar los envases utilizados de acuerdo a la legislación local vigente.

CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales debilitados, estresados, sedientos o aquellos que padezcan hepatopatías o mal nutrición. No tratar animales que pesen menos de 15 kg.

El laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado del producto. Conservar por debajo de los 30° C. No refrigerar. No congelar. En Perú: Conservar entre 15 y 30° C.

Mantener los envases bien cerrados en lugar seco, protegidos de la luz y el calor del sol. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Centros Toxicológicos: **Argentina:** Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Centro de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel.(021) 204-800/532. **República Dominicana:** CIDI. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.