

Medidas: 181mm de ancho x 209,5 mm de alto.

EFFECTO LÁMINA
PROTECTORA

6 DÍAS DE PROTECCIÓN

POLVO EN AEROSOL

Bactrovet[®]
oro^{AM}
Dualtap[®]

Bactrovet oro
Dualtap

Antimicrobiano de acción múltiple:

- Previene y trata la miasis.
- Resuelve procesos infecciosos secundarios.
- Favorece la cicatrización.



Imidacloprid • Etofeprox
Sulfadiazina de plata

AGITESE BIEN ANTES DE USAR

Fórmula: Cada 100 g de concentrado contiene: Imidacloprid 0,70 g; Etofeprox 0,70 g; sulfadiazina de plata 0,10 g; excipientes c.s.

Bactrovet Oro AM puede ser utilizado en caninos, felinos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Indicaciones: Tratamiento preventivo y curativo de infecciones y miasis en heridas, bactericida y repelente; ideal para heridas post-quirúrgicas y el ombligo de los recién nacidos. **Bactrovet Oro AM** resulta un aliado ideal en los trabajos de rutina: castraciones, descorne y descole. También, cuando se lo aplica al finalizar cirugías como por ejemplo cesáreas.

Bactrovet Oro AM es eficaz frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la sulfadiazina argéntica y a las larvas de moscas productoras de miasis: *Lucilia sp.*, *Calliphora sp.*, *Callitroga sp.* y *Sarcophaga sp.*

Aplicación: Agitar varias veces el envase antes de aplicar. Colocar el envase a 10 cm del área a tratar y rociar uniformemente, asegurando la penetración del producto dentro de la herida. Aplicar también alrededor de la misma, formando un halo de 5 cm. **En caso de bicheras profundas es necesario que el producto penetre en las cavidades, para ello utilizar la válvula en forma de cánula con efecto jet.** El color dorado de la herida permite determinar que el animal ha sido tratado. En caso de miasis la aplicación se puede repetir diariamente hasta la curación. La duración del tratamiento depende del tipo de afección y de la complicación de la herida, se recomienda continuar la aplicación hasta lograr la cicatrización. El número de aplicaciones a realizar como preventivo depende del tipo de herida y de las condiciones ambientales. En la prevención de las bicheras del ombligo basta con una sola aplicación dentro de las 24 horas del nacimiento. En caso de herida de castración en grandes animales se recomiendan dos aplicaciones separadas por 72 horas. Para otros tratamientos preventivos una aplicación ofrece hasta 6 días de protección.

Precauciones y Advertencias: Producto tóxico. No fumar, comer, ni beber durante su uso. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Aplicar a favor del viento para que no afecte al aplicador. Agitar varias veces el envase antes de aplicar. Lavarse las manos después de su aplicación. Utilizar guantes. No arrojar el envase al fuego. No perforar. No rellenar el envase. Si el producto contacta con la piel lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos deben lavarse profundamente por lo menos 15 minutos y luego consultar al médico.

Contraindicaciones y limitaciones de uso: El producto no posee contraindicaciones si se usa de acuerdo a las indicaciones. No aplicar en perros y gatos de menos de 8 semanas de edad. Evitar el contacto con la boca y los ojos de los animales. Peligrosa su ingestión. No usar en animales debilitados o convalecientes. Por lo tanto, el producto debe únicamente utilizarse en función de la evaluación beneficio-riesgo para estos animales. No ha quedado establecida la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia en las especies de uso. Utilizar de acuerdo con la evaluación beneficio-riesgo. Aplicar de acuerdo a la frecuencia recomendada.

Síntomas de intoxicación: salivación excesiva.
En caso de intoxicación se debe instaurar tratamiento sintomático.

Período de restricción:

En carne y leche. No posee restricciones.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Conservar en un lugar fresco, entre 15° y 35° C. No congelar. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: CIATOX: 1800-VENENO (836366). El Salvador: Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149. Guatemala: CIAT Tel. (502) 22513560 (502) 2232-0735. Honduras: Llamar o acudir al médico. Nicaragua: Centro Nac. de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289-7150/ 289-3328. Panamá: CIMET Tel. (507) 269-2741. Paraguay: Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-900 (int. 1011); 220-418. Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. Rep. Dominicana: CIDI. Tel. (1809)562-6001 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Rep. Bolivariana de Venezuela: UCV Tel. (212) 605-2586.

■ SENASA Cert. N° 16-044

■ Estab. Elab. N° 8.996 | Estab. Fracc. N° 8.645

Distribuido por **Laboratorios König S.A.** Uruguay 720. B1868BAB. Avellaneda, Buenos Aires. Tel. (011) 4208-4141 consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc.: Dr. Oscar Hortas. M.V. M.P. N°: 2216. En Uruguay: Imp. y dist. por **KÖNIG URUGUAY S.A.** García Lagos y Camino al paso Hondo, Colonia Nicolich, Canelones; 598 2698 3343. Dir. Téc. Dr. Raúl Lettes. direcciontecnica@koniglab.com. En Bolivia: SENASAG CR-PUV N° xxx. Imp. y dist. **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Parque Industrial Avenida Transversal 7 Mza. Pl 28 Lote 1 Esc. Diagonal 3. Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261 Dir. Téc.: Ernesto Rojas V. En Ecuador: N° xxx-AGROCALIDAD. Imp. y dist. **ECUQUIMICA.** Av. José Santiago Castillo y Av. Juan Tames Marengo. Km 1.8. Tel.: 04 2682 050. Guayaquil - Ecuador. En El Salvador: Imp. y dist. **RHEMA** Residencial Tazumal avenida los Bambúes Polígono # 3 Casa # 4 San Salvador, El Salvador. Regente Responsable: María Belén Quinterilla de Fernandez, Médico Veterinario. Identificación Profesional N° 295. En Guatemala: Reg. MAGA: xxx. Imp. y dist. **INMOVET S.A.** 2da Calle 17-40 Sector B1, San Cristóbal, Zona 8 de Mixco, Guatemala. Responsable Técnico: César Humberto Cardona Ovalleza. En Honduras: Imp. y dist. **AGRIVETS S.A.** Reg No. xxx. Residencial Palma Real, I Etapa, Bloque C No. 45, Tegucigalpa. Tel (504)22343170 Med Reg- Dra. Nadienka Casco. En Nicaragua: IPSA Cert. N° xxx. Imp. y dist. **INVERSIONES ANTARES S.A.** Carretera Norte Km 8 1/2 de los semáforos de la Subasta 200 mts al oeste, Managua, Nicaragua. Dir. Téc.: Dr. Jorge A. Sobalvarro Barquero. En Panamá: M.I.D.A. Reg. N° xxx. Imp. y dist. **DISTRIVET S.A.** Juan Díaz calle 1b. Tel. 507-2205621. distrivet@cablenet.net Responsable Técnico: Dra. Enilda Pinto ID. 728. En Paraguay: Reg. SENACSA N° XXX. Imp. por **CRESUR S.A.** Gral. Delgado N° 747 esa, Patrio Escobar RUC: 80014725-1 Tel: 021 901000. Asesor Técnico, Dra. Alicia Escobar N° Reg. Prof. 1882. En Perú: Imp. y dist. **GLOBALVET S.A.C.** Reg. SENASA N°: xxx. Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, Perú, Tel. (511) 719-0377. En Rep. Dominicana: Cert. N° xxx. Imp. y dist. **FLEXEMPAQUES S.R.L.** Calle 16 de Agosto N°1. Los pepines, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Tel.: (809) 241-3095/ 233-3222. En la Rep. Bolivariana de Venezuela: Reg. N° INSAI 2041P10110521496. Imp. por **GLOVETZ C.A.** Rif. J-40000322-9. Estado de Lara, ZP3001. Tel. (58)25-1415-5148. E-mail: glovetz@gmail.com. Asesor Técnico: M.V. José Ramos. CPE 0722519637. Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

Lote / elaboración / vencimiento:

ver el fondo del envase.

MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS

EXCLUSIVA VÁLVULA MULTIDIRECCIONAL QUE FACILITA EL MANEJO DEL ANIMAL



NO DAÑA
LA CAPA
DE OZONO



ANTIMIÁSICO

HEMOSTÁTICO

CICATRIZANTE

ALTA ADHERENCIA

REPELENTE

BACTERICIDA

ANTIMICÓTICO

Peso neto: 260 g | Contenido: 420 mL


USO VETERINARIO - Venta sin receta en locales

con asesoramiento profesional veterinario.

INDUSTRIA ARGENTINA

König

Colores:



cyan

magenta

yellow

black



P185C



base plata



Color dorado cobre
40 magenta + 100 amarillo



Plano y corte

Medidas: 181mm de ancho x 209,5 mm de alto.

EFECTO LÁMINA
PROTECTORA



● DÍAS DE PROTECCIÓN

POLVO EN AEROSOL

Bactrovet[®]
oro_{AM}
Dualtap[®]

**Bactrovet oro
Dualtap**

Antimiasmico de acción múltiple:

- Previene y trata la miasis.
- Resuelve procesos infecciosos secundarios.
- Favorece la cicatrización.