



Pantone®
Solid Coated
185 C
C: 0 M: 100 Y: 80 K: 0

Ancho: 5.3 cm
Altura: 10.1 cm
Profundidad: 5.2 cm
Solapa C: 18,7 mm
Solapa F: 13,4 mm

HEMODYNE® GR provee los factores específicos principales que intervienen en la síntesis de hemoglobina y la formación de glóbulos rojos, produciendo un estímulo para la actividad hematopoyética en los equinos. **Fórmula:** Cada 100 mL contiene: Citrato de hierro amoniacal 5,00 g; Cloruro de cobalto 0,10 g; Gluconato de cobre 0,10 g; Vitamina B 12 10,000 mcg; excipientes c.s.

Indicaciones: Anemia ferropénica, anemia hipocrómica, anemia por infección, anemia por parasitosis, anemia post-quirúrgica, anemia por hemorragia, anemia tóxica, anemia nutricional, anemia medicamentosa. **Preñez, Convalecencia, Administración y dosis:** 2 mL cada 100 kg de p.v. vía IM o EV lenta, por día, durante 5 a 10 días. En casos graves puede duplicarse la dosis (4 mL cada 100 kg de p.v.). **Contraindicaciones, acciones colaterales y secundarias:** No presenta. El elaborador no se hace responsable de las consecuencias que se produjesen por un uso inadecuado de este producto. Conservar por debajo de 30° C. No refrigerar. No congelar. El almacenamiento, transporte y destrucción del producto así como también el método de eliminación de los envases, deberá realizarse de acuerdo a las normativas municipales y/o locales vigentes. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. **Centros Toxicológicos:** **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicaciones. Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Costa Rica:** Centro Nac. de Intoxicaciones Tel. 223-1028. **Ecuador:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX): 1800-VENENO (836366) a Nivel Nacional. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **México:** Serv. de Inf. Toxicológica SINTOX 01800-009-2800 **Nicaragua:** Centro Nac. de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289-7150/ 289-3328. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** CIDL Tel.: (1809) 562-6601 ext. 1801 **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Rep. Bolivariana de Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Elaborado y Distribuido por LABORATORIOS KÖNIG S.A. Uruguay 720, B1868BAB, Avellaneda, Buenos Aires, consultatecnica@koniglab.com, Tel. (011) 4208-4141. Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, M.V. M. P. N° 2216. **Uruguay:** Importado y distribuido por **KÖNIG URUGUAY S.A.** García Lagos y Camino al Paso Hondo, Colonia Nicolich, Canelones, Tel. (+598) 22083920, Dir. Téc. Dr. Raúl Leites, direcciontecnicauy@koniglab.com.



2 mL / 100 kg



SENASA Cert. N° 85.312
Estab. Elaborador N° 5.580



König



7 791432 890248

König

Hemodyne® GR

Hemodyne® GR


USO VETERINARIO

Antianémico

Solución inyectable

CONT. NETO: 100 mL

Venta con receta veterinaria
Industria Argentina



König

LOTE:

FABR.:

VTO.:

EA9620-V1