

PROSPECTO AURIX THERAPY
MEDIDAS: 100 mm de ancho x 87 mm de alto

Uso veterinario
Venta con Receta Veterinaria

Aurix[®] GOTAS therapy[®]

Solución otodérmica Uso externo

AURIX Therapy es una solución a base de tiabendazol, sulfato de neomicina y acetona de triamcinolona, en un excipiente no oleoso de base anhidra y pH ácido. Extensos estudios de los últimos años han demostrado que el tiabendazol es un potente antiparasitario y fungicida de amplio espectro, particularmente activo contra los dermatofitos y levaduras más importantes en la etiología de las dermatitis y otitis de perros y gatos (*Microsporum spp.*, *Trichophyton spp.* y *Malassezia spp.*). El sulfato de neomicina es un antibiótico de amplio espectro, efectivo contra *Stafilococcus aureus* y *Proteus vulgaris*, entre otros, principales agentes etiológicos o participantes oportunistas de las dermatitis y otitis externas. La asociación con el tiabendazol produce un efecto complementario contra los agentes gram positivos y gram negativos e infecciones por hongos. La incorporación de acetona de triamcinolona (9 α -flour-11 β ,21-dihidroxi- 16 α 17 α -isopropilendioxipregna- 1,4 -diene- 3,20 diona) disminuye los síntomas de inflamación, dolor y/o prurito que suelen acompañar a las dermatitis y otitis externas. La acetona de triamcinolona es el antiinflamatorio de elección para uso tópico porque no se absorbe a través de la piel.

INDICACIONES: Otitis externas de origen bacteriano y/o micótico, en sus formas aguda y crónica | Otitis parasitaria por *Otodectes cynotis*. | Dermatitis parasitarias, bacterianas y/o micóticas de otras áreas cutáneas | Complicaciones bacterianas y/o micóticas secundarias de otras patologías óticas.

Especies: Caninos, felinos y equinos. En Uruguay: Prohibido su uso en equinos.

DOSIS y FORMA DE APLICACIÓN: **Otitis externa:** previo a la aplicación de Aurix Therapy, remover el material ceruminoso y/o purulento del canal auditivo. Insertar el pico vertedor en el canal auditivo e instilar 4 a 8 gotas 2 veces por día. **Dermatitis cutánea:** para una lesión de 2 cm de diámetro, aplicar 4 a 6 gotas aproximadamente, 2 veces al día (la cantidad de gotas requeridas dependerá de la extensión de la lesión) cuidando que la superficie afectada se mantenga humedecida con AURIX Therapy.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: En caso de otitis bacteriana o parasitaria, la duración del tratamiento será de 15 a 20 días. En caso de otitis micótica, el tratamiento será de 30 días de duración como mínimo. En caso de dermatitis bacteriana, la duración del tratamiento será de 15 a 20 días. En caso de dermatomycosis, el tratamiento será de 30 días como mínimo. El tratamiento debe continuarse hasta 3 días después de la remisión de las lesiones.

SISTEMA DE INVOLABILIDAD: El envase primario cuenta con un sistema de cierre por cremallera. La involabilidad del sistema de codificado se garantiza por el empleo de tinta indeleble que resiste la humedad, los rayos UV y los solventes comunes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen a las dosis recomendadas. Si excepcionalmente se presentara alguna reacción alérgica local, suspender el tratamiento. Se debe evitar el uso en caso de infecciones virales activas y en el síndrome de Cushing. La aplicación en heridas o lastimaduras puede provocar ardor y una leve acción irritativa que desaparece en pocos minutos. No administrar a equinos cuya carne se destine a consumo humano.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos. Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

ADVERTENCIAS: La aplicación en áreas muy erosionadas (heridas o lastimaduras producidas por el rascado del animal) puede producir leve acción irritativa que desaparece en 2 a 5 minutos.

FÓRMULA: Cada 100 mL contiene: tiabendazol 4 g; neomicina base (como sulfato de neomicina) 0,288 g; acetona de triamcinolona 0,10 g; excipiente anhidro c.s.p. 100 mL.

CONSERVACIÓN: Conservar a una temperatura inferior a 30° C. No refrigerar. No congelar.

CENTROS TOXICOLÓGICOS: **Argentina:** Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Costa Rica:** Centro Nac. de Intoxicaciones Tel. 2223-1028. **Ecuador:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX): 1800-VENENO (836366) a Nivel Nacional. **El Salvador:** Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT tel. (502) 22513560 (502) 2232-0735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **Nicaragua:** Centro Nac. de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289-7150/ 289-3328. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** CIDI. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **República Bolivariana de Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586.

Elab y dist. **LABORATORIOS KÖNIG S.A.** Uruguay 720, B1868BAB. Avellaneda, Buenos Aires Tel. (011) 4208-4141 consultatecnica@koniglab.com Dir. Tec. Dr. Oscar Hortas, M.V. M.P. N°: 2216.

En Argentina:

SENASA Cert. N° 84.153
Estab. Elab. N° 5.580

Importado y distribuido en: Ver estuche.
PA9330-V0

 **König**